

?

Хірургічна анатомія вивчає:

- Анатомічні утворення оточуючі орган в патологічних умовах
- +Варіації будови й розташування органів
- Вікові розходження у розмірах, формі й розташуванні органів
- Морфологічна будова окремих ділянок людського тіла
- Морфологію органа й навколишніх його утворень у патологічних умовах

?

Вікова анатомія вивчає:

- Системи органів
- Анатомічні утворення оточуючі орган в патологічних умовах
- Варіації будови й розташування органів
- +Вікові розходження у розмірах, формі й розташуванні органів
- Морфологію органа й навколишніх його утворень у патологічних умовах

?

Топографічна анатомія вивчає:

- Системи органів
- Варіації будови й розташування органів
- Виконання хірургічних операцій, суть яких полягає в механічній дії на органи і тканини тіла людини з діагностичною або лікувальною метою
- +Будову, форму і взаємне розміщення органів і тканин в окремих ділянках людського тіла
- Анатомічні утворення оточуючі орган в патологічних умовах

?

Скелетотопія - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Відношення анатомічних утворень до тіла і його ділянок
- Розташування анатомічних утворень по відношенню друг до друга в розглянутій ділянці
- +Відношення анатомічних утворень до кісткового скелету
- Вивчення відносин найважливіших утворень організму до норми

?

Голотопія - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Відношення анатомічних утворень до кісткового скелету
- Розташування анатомічних утворень відносно друг до друга в розглянутій ділянці
- +Відношення анатомічних утворень до тіла і його ділянок
- Послідовне розсічення тканин з поверхні в глибину

?

Синтопія - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Відношення анатомічних утворень до тіла і його ділянок
- +Розташування анатомічних утворень по відношенню друг до друга в розглянутій ділянці
- Відношення анатомічних утворень до кісткового скелету

-Вивчення відносин анатомічних утворень організму до норми

?

Оперативна хірургія вивчає:

- Варіації будови й розташування органів
- Відношення анатомічних утворень до тіла і його ділянок
- Відношення анатомічних утворень до кісткового скелету
- +Техніку хірургічних операцій
- Розташування анатомічних утворень по відношенню друг до друга в розглянутій ділянці

?

Ампутація (amputatio) - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Висічення органа або кінцівки з обов'язковим збереженням периферичної частини органа
- +Відсікання периферичної частини органа протягом
- Видалення органа
- Вичленовування периферичної частини органа на рівні суглоба

?

Екзартикуляція (exarticulatio) - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Висічення органа або кінцівки з обов'язковим збереженням периферичної частини органа
- Видалення органа
- +Вичленовування периферичної частини органа на рівні суглоба
- Відсікання периферичної частини органа

?

Резекція (resectio) - це:

- Варіації будови й розташування органів
- Видалення органа
- Відсікання периферичної частини органа
- Прокол органа
- +Висічення органа або кінцівки з обов'язковим збереженням периферичної частини органа

?

Анатомічна доступність:

- Варіації будови й розташування органів
- Можливість доступу до органа без ушкодження тканин
- Поверхнєве розташування органа
- +Можливість провести розріз для оголення патологічного вогнища без ушкодження життєво важливих утворень
- Розріз, що забезпечує найближчий доступ до об'єкта втручання

?

Оперативним доступом називають:

- Варіації будови й розташування органів
- Основну частину хірургічного втручання
- Вибраний спосіб видалення патологічного вогнища
- +Частина операції, що забезпечує раціональний підхід до органа й найбільший простір
- Видалення органа

?

Оперативним прийомом називають:

- Варіації будови й розташування органів
- Етап операції, що забезпечує найменше травмування тканин

- Метод і спосіб, спрямовані на усунення патологічного вогнища

- +Методику проведення операції

- Особливості техніки даної операції

?

Первинна хірургічна обробка рани - це:

- Обробка рани відразу після поранення

- Висічення стінок рани

- Висічення дна рани в межах здорових тканин

- +Перше втручання на рані за первинними показниками до розвитку ознак запалення в рані

- Видалення забруднених ділянок рани

?

Повна хірургічна обробка рани - це:

- Висічення дна рани в межах здорових тканин

- Обробка рани із промиванням її антисептиками

- Обробка рани із промиванням її антибіотиками

- Перше втручання на рані за первинними показниками до розвитку ознак запалення в рані

- +Висічення стінок і дна рани в межах здорових тканин

?

Рання хірургічна обробка рани - це обробка:

- Через 12 год після травми

- До 18 год після травми

- через 10 годин після травми

- +У перші 6 год після травми

- Через 24-36 год після травми

?

Відстрочена хірургічна обробка інфікованої рани - це обробка:

- Через 6 год після травми

- До 18 год після травми

- До 10 годин після травми

- +Через 24-48 год після травми

- Через 18-24 год після травми

?

Пізня хірургічна обробка інфікованої рани - це обробка в строки:

- 18-24 год після поранення

- До 10 годин після травми

- 24-36 год після поранення

- Пізніше 72 год після поранення

- +48 і пізніше після поранення

?

Первинний шов:

- Перший шов, що накладається на рану

- +Шов, що накладається на свіжу чисту рану відразу після первинної хірургічної обробки

- Шов, що накладається на інфіковану чисту рану без первинної хірургічної обробки

- Перший шов, що накладається на поверхневі тканини

- Перший шов, що накладається на дно рани

?

Екстрені операції - це операції:

- Що займають при виконанні малий час

- Призначені без проведення обстеження

- Операція, що усуває болючий синдром

- +Операції, без яких хворий неминуче загине в самий найближчий час

- Виконуються досвідченим хірургом у стислий термін

?

Що таке радикальна операція?

- Операція, що усуває болючий синдром

- +Операція, що повністю усуває патологічне вогнище

- Технічно проста операція

- Операції, без яких хворий неминуче загине в самий найближчий час

- Операція, що може виконати будь-який хірург

?

Що таке паліативна операція?

- +Операція, що ліквідує основний симптом

- захворювання, який загрожує життю

- Операція, що ліквідує патологічне вогнище

- Операції, без яких хворий неминуче загине в самий найближчий час

- Найбільш проста по техніці виконання

- Неправильно обрана операція

?

Інфільтраційна анестезія полягає:

- У введенні анестетика в інфільтрат

- У нанесенні препарату на слизуваті оболонки або шкіру

- +У тугій пошаровій інфільтрації м'яких тканин

- У введенні розчину анестетика під фасцію, що утворить футляр для органа

- У введенні розчину анестетика під окістя

?

При виконанні футлярної анестезії:

- Роблять тугу пошарову інфільтрацію м'яких тканин в ділянці операції слабкими розчинами анестетика

- Роблять тугу пошарову інфільтрацію м'яких тканин в ділянці операції сильними розчинами анестетика

- +Розчин анестетика вводять під фасцію, що утворить футляр для органа

- Анестетик вводять у нервові волокна або довкола нього

- Анестетик вводять у футляр спинного мозку

?

Провідникова анестезія досягається:

- Введенням розчину анестетика під фасцію, що утворить футляр для органа

- +Інфільтрацією препаратом нервових стовбурів і сплетень

- Тугою пошаровою інфільтрацією м'яких тканин в ділянці операції слабкими розчинами анестетика

- Введенням анестетика за допомогою провідника

- Анестетик вводять у нервові волокна або довкола нього

?

Наявністю яких конструктивних елементів хірургічний пінцет відрізняється від анатомічного?

- Наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами

- +Наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків

- Наявністю на кінцях браншів поперекових насічок

- Наявністю більших розмірів

- Наявністю на кінцях браншів усіх вказаних елементів

?

Наявністю яких конструктивних елементів анатомічний пінцет відрізняється від хірургічного?

- Наявністю на кінцях браншів гострих зубчиків
- Наявністю на кінцях браншів лапок з щербинами
- Наявністю на кінцях браншів поперекових насічок та гострих зубчиків
- +Наявністю на кінцях браншів поперекових насічок
- Наявністю більших розмірів

?

Для чого використовуються кліпси для білизни?

- Для фіксації хірургічної білизни
- Для утримання інструментів
- Для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.) та для утримання органів (язик, ребро, сімений канатик і ін.)
- +Для фіксації хірургічної білизни, для утримання дренажів, трубок, для утримання органів (язик, ребро, сімений канатик і ін.)
- Для фіксації хірургічної білизни, для утримання інструментів (дренажі, трубки і ін.)

?

Скільки і які класичні позиції скальпеля використовуються під час оперативного втручання?

- три: столового ножа, смичка, в кулаці
- дві: смичка, в кулаці
- +Три: столового ножа, писального пера, смичка
- Три: писального пера, смичка, в кулаці
- Чотири: столового ножа, писального пера, смичка, в кулаці

?

Яким з наведених вимог повинен відповідати розтин шкіри?

- Напрямку шкіряних зморшок
- Напрямку росту волосся
- Дотримання класичних позицій скальпеля
- Відповідність розтину лініям Лангера шкіри
- +Відповідність розтину ходу великих судин
- Всім вказаним вимогам

?

В чому полягає загальний принцип роз'єднання тканин?

- Відповідність розтину проекції органу, до якого робиться доступ
- +Суворе пошаровість
- Відповідність розтину проекції судин і нервів органу, до якого робиться доступ
- Відповідність розтину проекції органу
- Всім вказаним вимогам

?

Які з наведених способів зупинки кровотечі не ефективні при гемостазі з судин підшкірної клітковини?

- Пальцеве затискування
- Затискування серветкою
- Накладання кровоспинних затискачів
- електрокоагуляція
- +Тампонування гемостатичною губкою

?

Які з наведених тканин захоплюються хірургічними пінцетами?

- М'язи
- +Фасції і апоневрози

-Внутрішні органи

-Кишка

-Судини і нервові стовбури

?

Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і зубчиками на їх кінцях?

- Затискач Більрота
- Затискач Пеана
- +Затискач Кохера
- Затискач Федорова
- Затискач "москіт"

?

Чим відрізняється кровоспинний затискач "москіт" від затискача Більрота?

- Меншими розмірами
- Меншою масою
- Загостреними щічками
- +Всіма вказаними особливостями
- Наявністю дрібною насічками

?

Які з наведених тканин фіксуються гострими хірургічними гачками?

- М'язи
- Внутрішні органи
- Стінка кишки
- +Фасції і апоневрози
- Судини і нервові стовбури

?

Яку назву має кровоспинний затискач з прямими або зігнутими щічками і поперечними насічками на їх кінцях?

- Затискач Кохера
- +Затискач Більрота
- Затискач Пеана
- Затискач Федорова
- Затискач "москіт"

?

Яким з наведених інструментів рекомендується зупинити кровотечу з судин внутрішніх органів?

- Затискач Кохера
- Затискач Лангенбека
- Затискач Федорова
- +Затискач Більрота
- Затискач Лайне

?

Яким з наведених інструментів рекомендується зупинити кровотечу з судин серозних оболонок?

- Затискач Кохера
- +Затискач Більрота
- Затискач Алліса
- Затискач Федорова
- Затискач Пеана

?

Який кровоспинний затискач рекомендується використовувати для зупинки кровотечі з судин підшкірної клітковини?

- Затискач Більрота
- +Затискач Кохера
- Затискач Федорова
- Затискач Пеана
- Затискач "москіт"

?

Який інструмент використовується для відокремлення окістя від плоских кісток при оперативному втручанні?

- +Распатор Фарабефа
- Распатор Дуайєна
- Ребровий распатор
- Распатор Лангенбека
- Ретрактор

?

Який інструмент використовується для відокремлення окістя від внутрішньої поверхні ребер при оперативному втручанні?

- +Распатор Дуайєна
- Распатор Фарабефа
- Т-подібний распатор
- Ложкове долото Корнева
- Распатор Лангенбека

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання шкіри?

- Колючі
- Круглі
- +Різальні (тригранні)
- Дешана
- Змішані

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання підшкірної клітковини?

- Колючі
- Дешана
- Круглі
- +Різальні (тригранні)
- Атравматичні

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання м'язів?

- Різальні
- Тригранні
- Дешана
- Змішані
- +Колючі (круглі)

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання тканин внутрішніх органів?

- +Колючі (круглі)
- Різальні
- Тригранні
- Дешана
- Змішані
- Купера

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання судин?

- Різальні
- +Атравматичні
- Тригранні
- Дешана
- Змішані

?

Які хірургічні голки використовуються для зшивання нервових стовбурів?

- Різальні
- Тригранні
- Дешана
- +Атравматичні
- Змішані

?

При зав'язуванні хірургічного лігатурного вузла проводиться перекручування нитки. При використанні якого прийому утвориться хірургічний вузол?

- Двократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі
- Двократне перекручення нитки на другому вузлі і двократне перекручення нитки на третьому вузлі
- Однократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі
- Однократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на першому вузлі
- +Двократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі

?

При зав'язуванні простого (жіночого) лігатурного вузла проводиться перекручування нитки. При використанні якого прийому утвориться простий вузол?

- Двократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі
- +Однократне перекручення нитки на першому вузлі і однократне перекручення нитки на другому вузлі
- Двократне перекручення нитки на першому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі
- Двократне перекручення нитки на другому вузлі і двократне перекручення нитки на другому вузлі
- Двократне перекручення нитки на другому вузлі і двократне перекручення нитки на третьому вузлі

?

Укажіть, які ділянки виділяють у межах склепіння черепа?

- лобову, тім'яну, скроневу, склепіння черепа
- +лобово-тім'яно-потиличну, скроневі, ділянки соскоподібного відростка;
- скроневу, ділянки соскоподібного відростка, тім'яну
- скроневу, ділянки соскоподібного відростка, потиличну
- ділянки соскоподібного відростка, потиличну, скроневі, склепіння черепа

?

Які шари склепіння черепа входять у склад скальпованого клаптя?

- підшкірно-жирова клітковина, сухожилковий апоневроз, окістя
- підшкірно-жирова клітковина, сухожилковий апоневроз
- шкіра, сухожилковий апоневроз, підокісна клітковина
- +шкіра, підшкірно-жирова клітковина, сухожилковий апоневроз
- шкіра, підшкірно-жирова клітковина, підапоневротична клітковина

?

Скільки шарів жирової клітковини в ділянці склепіння черепа?

- один
- два
- чотири

-шість

+три

?

В якому шарі клітковини знаходяться основні судини і нерви склепіння черепа?

+у підшкірній клітковині

-у підапоневротичній клітковині

-у сухожилковому апоневрозі

-у окісті

-у шкірі

?

Які судини та нерви проходять у підшкірній клітковині лобової ділянки?

-a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis

-a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus

+a., v. et n. supratrochlearis, a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

-a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. auricularis posterior

-a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

?

Гілкою якого нерва є лобовий нерв (n. frontalis)?

-n. facialis

-n. opticus

-n. auriculotemporalis

+n. ophthalmicus

-n. mandibularis

?

Які судини та нерви проходять у підшкірній клітковині тім'яної ділянки?

-a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. auricularis posterior

-a., v. et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor

-a., v. et n. supratrochlearis, a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

+a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis

-a., v. et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major

?

Які судини та нерви проходять у підшкірній клітковині потиличної ділянки?

-a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major, n. auricularis magnus

-a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis

-a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major

-a., v. et n. supratrochlearis, a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

+a., v. et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major

?

Укажіть проекцію виходу a. supratrochlearis в лобову ділянку?

-на межі середньої та присередньої третини margo supraorbitalis

-на 3 см зовні від присередньої третини margo supraorbitalis

-на 3 см до середини від присередньої третини margo supraorbitalis

+в точці перетину margo supraorbitalis з вертикальною лінією проведеною через присередній кут ока

-на 1 см донизу від glabella

?

Укажіть проекцію виходу надочнямкової артерії (a. supraorbitalis) в лобову ділянку?

-в точці перетину margo supraorbitalis з вертикальною лінією проведеною через присередній кут ока

-вддовж латерального краю очниці

-на 3 см до середини від присередньої третини margo supraorbitalis

-по передньому краю жувального м'язу

+на межі середньої та присередньої третини margo supraorbitalis

?

Укажіть проекцію виходу a. temporalis superficialis, де вона може бути притиснута до кістки з метою тимчасової

зупинки кровотечі:

+спереду від козелка вушної раковини

-вддовж латерального краю очниці

-на 3 см до середини від присередньої третини margo supraorbitalis

-по передньому краю жувального м'язу

-позаду від козелка вушної раковини

?

Укажіть проекцію виходу великого потиличного нерва?

-у точці, на середині відстані між соскоподібним відростком і верхнім шийним хребцем

+у точці, на середині відстані між соскоподібним відростком і зовнішнім потиличним бугром

-спереду від козелка вушної раковини

-на 3 см до середини від присередньої третини margo supraorbitalis

-по задньому краю прикріплення вушної раковини

?

Гілкою якого нерва є великий потиличний нерв (n. occipitalis major)?

-шийного сплетіння

-n. facialis

-n. opticus

+задньою гілкою другого шийного нерва

-n. auricularis magnus

?

Гілкою якого нерва є малий потиличний нерв (n. occipitalis minor)?

-задньою гілкою другого шийного нерва

-n. ophthalmicus

-n. facialis

-n. opticus

+шийного сплетіння

?

Які м'язи пронизує великий потиличний нерв?

+напівовстисту, трапецієподібний

-грудино-ключично-соскоподібний м'яз

-верхній косий м'яз голови

-нижній косий м'яз голови

-трапецієподібний

?

Лімфатичні судини лобово-тім'яно-потиличної ділянки впадають у наступні лімфатичні вузли:

-auricularis posterior, retroauricularis, temporalis superficialis

+parotidei superficialis et profundi, retroauricularis, occipitales
-supraorbitalis, supratrochlearis, occipitales
-auricularis posterior, retroauricularis
-mandibularis, maxillaris, retroauricularis, occipitales
?

Які за класифікацією виділяють зовнішньочерепні гематоми?

-епідуральні, субдуральні, субарахноїдальні
--підапоневротичні, підокістні, субарахноїдальні
-підшкірні, епідуральні, субдуральні
+підшкірні, підапоневротичні, підокістні
-підапоневротичні, підокістні, субарахноїдальні
?

У яких сполучнотканинних шарах зовнішньої основи склепіння черепа є анатомічні передумови для утворення розлитих гематом?

-в підшкірній клітковині, в субарахноїдальному просторі
-в середині кістки, в субдуральному просторі
-в підшкірній клітковині та в підокістній клітковині
-в підшкірній клітковині, в підапоневротичній клітковині
+в підапоневротичній клітковині, в підокістній клітковині
?

В якому шарі склепіння черепа локалізована гематома у вигляді гуглі?

+в підшкірній клітковині
-в підапоневротичній клітковині
-в підокістній клітковині
-в середині кістки
-в субарахноїдальному просторі
?

Який вид мають гематоми в підшкірній клітковині склепіння черепа?

-розлиті, займають всю поверхню склепіння черепа
-розлиті, займають всю поверхню скроневої ділянки
+у вигляді гуглі мають вигляд обмеженої припухлості
-обмежені лінією прикріплення надчерепного м'язу
-обмежені лінією прикріплення швів черепа
?

Який вигляд мають гематоми в підапоневротичній клітковині?

-мають вигляд обмеженої припухлості
-обмежені лінією прикріплення швів черепа
+розлиті, займають всю поверхню склепіння черепа, обмежені лінією прикріплення надчерепного м'язу
-у вигляді гуглі
-у вигляді гуглі мають вигляд обмеженої припухлості
?

У хворого із травмою голови діагноз розлита гематома м'яких тканин склепіння черепа, що нависає над надбрівними дугами. У якому шарі вона розташована?

-у підокістній клітковині
-у підшкірній клітковині
-в окісті
+у підапоневротичній клітковині
-в субарахноїдальному просторі
?

Який вигляд мають підокістні гематоми?

+обмежені лінією прикріплення швів черепа
-займають всю поверхню склепіння черепа
-розлиті, займають всю поверхню склепіння черепа

-обмежені лінією прикріплення надчерепного м'язу
-мають вигляд обмеженої припухлості
?

Які розрізи на склепіння черепа є анатомічно обґрунтованими й найменш травматичними?

-поздовжні
+радіальні
-Т-подібні
-поперечні
-Z - подібні
?

Сильна кровотеча при пораненні лобово-тім'яно-потиличної ділянки можлива у зв'язку з наступними обставинами:

-кровопостачання здійснюється гілками зовнішньою сонною артерією, судини проходять під апоневрозом, дуже виражена клітковина, відносно великий діаметр судин цієї ділянки

-зв'язки судин склепіння з судинами інших ділянок голови і шиї, стінки кровоносних судин зв'язані з фіброзними перетинками, судини проходять під апоневрозом, зв'язки судин склепіння з пазухами твердої оболонки

+судини проходять у підшкірній клітковині над апоневрозом, адвентиція судин фіксована з фіброзними перетинками

-кровопостачання потиличної ділянки здійснюється тільки гілками зовнішньої сонної артерії, а інші ділянки внутрішньою сонною артерією

-кровопостачання потиличної ділянки здійснюється тільки гілками зовнішньої сонної артерії, а інші ділянки внутрішньою сонною артерією і мають великий тиск
?

З яких ярусів (поверхів) складається венозна система лобово-тім'яно-потиличної ділянки?

-діплоїчні вени, емісарні вени, поверхневі вени великого мозку

-вени покривів, емісарні вени, глибокі вени великого мозку

-з 5 ярусів

-діплоїчні вени, венозне сплетення овального отвору, пазухи твердої мозкової оболонки

+вени покривів, діплоїчні вени, пазухи твердої мозкової оболонки

?

Що з'єднує sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis?

+v. emissaria parietalis
-v. emissaria mastoidea
-sinus sigmoideus
-v. emissaria occipitalis
-plexus venosus foraminis ovalis
?

Що з'єднує v. emissaria occipitalis?

-sinus sigmoideus та v. auricularis posterior
+sinus transversus та vv. occipitales
-plexus venosus foraminis ovalis
-sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis
-sinus sigmoideus та vv. occipitales

?

Що з'єднує v. emissaria mastoidea?

-sinus transversus та v. temporalis superficialis

-sinus sigmoideus та vv. occipitales

-plexus venosus foraminis ovalis

+sinus sigmoideus та v. auricularis posterior

-sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis

?

Яким способом поширюється інфекція з інфікованих ран і гнійних захворювань м'яких тканин покривів голови в синуси твердої мозкової оболонки?

-vv. diploicae

-вена Тролара

-вена Лаббе

-sinus transversus

+vv. emissariae

?

Як можна зупинити кровотечу з судин кісток?

-електрокоагуляція, прошивні лігатури, кліпсування

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпсування, тампонада гемостатичною губкою

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

+втиранням воску, штифтування, електрокоагуляція, роздавлення кістковими кусачками

?

Який шар кістки найчастіше ушкоджуються при переломі кісток склепіння черепа?

+внутрішня пластинка

-зовнішня пластинка

-губчатка

-диплоє

-усі шари

?

Скільки шарів мають кістки склепіння черепа?

-два

+три

-шість

-чотири

-п'ять

?

Як зупиняють кровотечу з судин твердої мозкової оболонки?

-втиранням воску, штифтування, електрокоагуляція, роздавлення кістковими кусачками

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпсування, тампонада гемостатичною губкою

+прошивні лігатури, кліпсування

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

-пластиною по Брюннгу-Бурденко

?

Як зупинити кровотечу з судин м'якої мозкової оболонки?

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

-тампонада гемостатичною губкою, тампонада мотком кетгута,

-за допомогою кровоспинних затискачів

-ушивають вузловими швами, пластиною по Брюннгу-Бурденко

+змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпсування, тампонада гемостатичною губкою

?

Назвіть синус твердої мозкової оболонки, який найчастіше ушкоджується при травмах склепіння мозкового відділу голови?

+sinus sagittalis superior

-sinus sagittalis inferior

-sinus transversus

-sinus rectus

-sinus sigmoideus

?

Як можна зупинити кровотечу з венозних синусів?

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпсування, тампонада гемостатичною губкою

+тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

-тампонада гемостатичною губкою, тампонада мотком кетгута

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпсування

-за допомогою кровоспинних затискачів

?

При операції в порожнині черепа ушкоджені синуси твердої мозкової оболонки. Як зупиняють кровотечу із синусів твердої мозкової оболонки по Бурденко?

-тампонадою порожнини шматком м'яза

-тампонадою порожнини шматком шкіри

-тампонадою порожнини кетгута

+прошиванням П-образного шматка зовнішнього листка твердої мозкової оболонки

-прошиванням обох кінців синуса лігатурою

?

Коли поранення голови вважають проникаючими?

-при пошкодженні павутинної мозкової оболонки

-при пошкодженні внутрішньої пластинки кістки черепа

-при пошкодженні зовнішньої пластинки кістки черепа

-при пошкодженні м'якої мозкової оболонки

+при пошкодженні твердої мозкової оболонки

?

Хірург здійснює вихід з операції. Відповідно до класифікації хірургічних інструментів, які із зазначених інструментів відноситься до голкотримачів?

+Троянова, Матьє, Гегара

-Більота, Кохера

-Пайєра, Дуайєна, Богуша

-Фарабефа, Олье, Олівекроні

-Троянова, Матьє, Дальгрена, Джиглі

?

Що з'єднує sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis?

+v. emissaria parietalis

-v. emissaria mastoidea

-v. emissaria occipitalis

-plexus venosus foraminis ovalis

-v. temporalis superficialis

?

Що з'єднує v. emissaria occipitalis?

-sinus sigmoideus та v. auricularis posterior

+sinus transversus та vv. occipitales

-sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis

-sinus sigmoideus та vv. occipitales

-v. emissaria mastoidea та vv. occipitales

?

Що з'єднує v. emissaria mastoidea?

-sinus transversus та v. temporalis superficialis

-sinus sigmoideus та vv. occipitales

+sinus sigmoideus та v. auricularis posterior

-sinus sagittalis superior та v. temporalis superficialis

-v. emissaria mastoidea та vv. occipitales

?

Яким способом поширюється інфекція з інфікованих ран і гнійних захворювань м'яких тканин покривів голови в синуси твердої мозкової оболонки?

-vv. diploicae

-вена Тролара

-вена Лаббе

-plexus venosus foraminis ovalis

+vv. emissariae

?

У якому напрямку розташований falx cerebri?

+у сагітальному

-у фронтальному

-у вертикальному

-у горизонтальному

-у паралельному

?

Що розділяє falx cerebri?

-потиличні ділянки мозку від мозочка

+півкулі мозку

-півкулі мозочка

-середній мозок від довгастого

-довгастий мозок від мозочка

?

Де прикріплюється falx cerebri?

-до країв sulcus sinus transversus

+до країв sulcus sinus sagittalis

-до внутрішнього потиличного гребеня

-уздовж верхнього краю пірамід

-до країв sulcus sinus sigmoideus

?

У якому напрямку розташований tentorium cerebelli?

-вертикально

-фронтально

+горизонтально

-сагітально

-перпендикулярно

?

Куди проникає tentorium cerebelli?

-між півкулі мозку

-між півкулями мозочка

+у поперечну щілину мозку

-під основу черепа

-між лобовою та скроневою частками

?

Що проходить через тенторіальну щілину?

+стовбур мозку

-блоковий нерв

-v. cerebri magna

-sinus sagittalis inferior

-sinus rectus

?

Де розташований sinus sagittalis superior?

-по нижньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis

+по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis

-в ділянці з'єднання falx cerebri з tentorium cerebelli

-по sulcus transversus потиличної кістки

-по sulcus sigmoideus потиличної кістки

?

Назвіть синус твердої мозкової оболонки, що

безпосередньо зв'язаний з венозною системою лица?

-прямий

-верхній кам'янистий

+печеристий

-сигмоподібний

-нижній кам'янистий

?

Куди відкривається sinus sagittalis superior?

-в sinus rectus

-в sinus sigmoideus

-в sinus cavernosus

+в sinus transversus

-у верхній кам'янистий

?

Де розташований sinus sagittalis inferior?

+уздовж нижнього краю falx cerebri

-уздовж верхнього краю falx cerebri

-місце внутрішнього потиличного виступу

-місце з'єднання falx cerebri та tentorium cerebelli

-по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis

?

Куди відкривається sinus sagittalis inferior?

-в sinus transversus

+в sinus rectus

-у верхній кам'янистий

-в sinus sigmoideus

-в sinus occipitalis

?

Де розташований sinus rectus?

-уздовж верхнього краю falx cerebri

-уздовж нижнього краю falx cerebri

+місце з'єднання falx cerebri та tentorium cerebelli

-уздовж внутрішнього потиличного гребеня

-по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis

?

Куди впадає sinus rectus?

-в sinus sigmoideus

-в sinus cavernosus

-в sinus sagittalis inferior

+в sinus transversus

-у верхній кам'янистий
?
Де розташований sinus transversus?
+місце прикріплення tentorium cerebelli до борозни os occipitalis
-в sulcus sinus sagittalis
-в sulcus sinus sigmoideus
-по crista occipitalis interna
-по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis
?
Де розташований sinus occipitalis?
-по sulcus transversus потиличної кістки
+уздовж заднього краю falx cerebelli, по crista occipitalis interna
-по боках турецького сідла
-у місці злиття falx cerebri з tentorium cerebelli
-по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis
?
Куди відкривається sinus occipitalis?
-в sinus transversus
-в sinus rectus
+в sinus sigmoideus
-в sinus sagittalis superior
-у верхній кам'янистий
?
Де розташований sinus cavernosus?
-по верхньому краю піраміди скроневої кістки
-по нижньому краю піраміди скроневої кістки
-по crista occipitalis interna
+з боків від турецького сідла
-по верхньому краю falx cerebri, в sulcus sinus sagittalis
?
Завдяки яким утворенням здійснюється зв'язок печеристого синуса з верхнім сагітальним?
+вена Тролара
-вена Лаббе
-v. cerebri magna
-vv. ophthalmicae
-crista occipitalis interna
?
Завдяки яким утворенням здійснюється зв'язок печеристого синуса з венозною системою лица?
-plexus venosus foraminis ovalis
+v. ophthalmica superior et inferior
-вена Тролара
-вена Лаббе
-crista occipitalis interna
?
Яка вена з'єднує sinus cavernosus з sinus transversus?
-вена Тролара
-v. cerebri magna
+вена Лаббе
-vv. ophthalmicae
-v. cerebri media superficialis
?
Що проходить через верхню стінку sinus cavernosus?
-n. ophthalmicus
-n. abducens at a. carotis interna
-n. facialis
-v. cerebri magna
+n. oculomotorius at n. trochlearis

?
Що проходить у латеральній стінці sinus cavernosus?
+n. ophthalmicus
-n. oculomotorius
-n. trochlearis
-n. abducens
-a. carotis interna
?
Що проходить через sinus cavernosus?
-n. ophthalmicus
+n. abducens at a. carotis interna
-n. oculomotorius
-n. opticus
-n. trochlearis
?
Що спостерігається при тромбозі sinus cavernosus?
-симптом Бера
-синдром Мак-Кензі
+синдром Фуа
-синдром Сладера
-синдром Горнера
?
Перерахуйте клінічні прояви тромбозу sinus cavernosus?
-пульсуюча витрішкуватість
-кривошия
-афонія
-дисфагія
-амавроз
+повна офтальмоплегія, витрішкуватість, птоз
?
Що спостерігається при ушкодженні sinus cavernosus?
+пульсуюча витрішкуватість
-дисфагія
-афонія
-синдром Фуа
-амавроз
?
Якою артерією кровопостачається тверда мозкова оболонка передньої черепної ямки?
-a. meningea media
+a. meningea anterior
-a. ophthalmica
-a. carotis interna
-a. meningea posterior
?
Якою артерією кровопостачається тверда мозкова оболонка середньої черепної ямки?
-a. meningea anterior
-a. meningea posterior
+a. meningea media
-a. carotis interna
-a. meningea posterior
?
Якою артерією кровопостачається тверда мозкова оболонка задньої черепної ямки?
-a. meningea posterior (гілка a. occipitalis)
-a. meningea posterior (гілка a. auricularis posterior)
-a. meningea posterior (гілка a. maxillaris)
+a. meningea posterior (гілка a. pharyngea ascendens)
-a. meningea posterior (гілка a. meningea media)

?

Якими нервами іннервується тверда мозкова оболонка головного мозку?

+r. tentorii (гілка n. ophthalmicus); r. meningeus medius (від n. maxillaris); r. meningeus (від n. mandibularis); r. meningeus (від n. vagus)
-r. meningeus medius (від n. maxillaris); r. meningeus (від n. mandibularis); r. auricularis (від n. vagus)
-n. olfactorius; rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum (від n. maxillaris); radix cranialis, radix spinalis (від n. accessorius)
-n. olfactorius; rr. ganglionares ad ganglion pterygopalatinum (від n. maxillaris)
-r. tentorius, r. meningeus recurrens, r. meningeus anterior (гілки n. ophthalmicus); r. meningeus medius (від n. maxillaris)

?

Який тиск спинномозкової рідини в положенні лежачи?

-120-180 мм ртутного стовпа
+120-180 мм водяного стовпа
-200-250 мм водяного стовпа
-200-250 мм ртутного стовпа
-120-80 мм водяного стовпа

?

Який тиск спинномозкової рідини в положенні сидячи?

-200-250 мм ртутного стовпа
-120-180 мм водяного стовпа
+200-250 мм водяного стовпа
-120-180 мм ртутного стовпа
-1200-80 мм водяного стовпа

?

Які ліквородинамічні проби використовують для оцінки прохідності підпаутинного простору?

-пробу Дельбе-Пертеса
-пробу Троянова-Тренделенбурга
-пробу Гаккенбруха
+пробу Квеккенштедта та Стукея
-проба Неймарка

?

Назвіть можливі шляхи циркуляції спинномозкової рідини?

+з IV шлуночка через Сільвієв водопровід в III шлуночок
-з IV шлуночка через отвір Мажанді та Лушки в III шлуночок
-з IV шлуночка через отвір Монроево в III шлуночок
-з IV шлуночка через отвір Мажанді та Лушки в II шлуночок
-з IV шлуночка через Сільвієв водопровід у бічні шлуночки

?

Які артерії утворюють артеріальне кільце мозку попереду?

-a. carotis interna
+a. communicans anterior
-a. communicans posterior
-a. cerebri anterior
-a. meningea media

?

Які артерії утворюють артеріальне кільце мозку збоку?

-a. cerebri posterior
-a. cerebri anterior

+a. communicans posterior

-a. communicans anterior

-a. meningea media

?

Які артерії утворюють артеріальне кільце мозку позаду?

-a. cerebri anterior
-a. communicans anterior
-a. communicans posterior
+a. cerebri posterior
-a. meningea media

?

Які вени мозку створюють обхідний кровотік і мають практичне значення при перев'язці верхнього сагітального синуса?

+вена Тролара та вена Лаббе
-v. cerebri media superficialis
-vv. cerebri superiores
-vv. cerebri inferiores
-vv. meningea

?

Що спостерігається при пошкодженні I пари черепно-мозкових нервів?

-амавроз
+аносмія
-амбліопія
-афонія
-strabismus convergens

?

Що спостерігається при пошкодженні II пари черепно-мозкових нервів?

-strabismus divergens, ptosis et mydriasis
-strabismus convergens
+амбліопія та амавроз
-афонія
-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні III пари черепно-мозкових нервів?

-амбліопія та амавроз
-афонія та аносмія
-геміанопсія
+strabismus divergens, ptosis et mydriasis

-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні IV пари черепно-мозкових нервів?

+розкосе стояння очних яблук, діпlopія
-дисфагія
-strabismus divergens
-strabismus convergens
-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні VI пари черепно-мозкових нервів?

-strabismus divergens
+strabismus convergens
-мідріаз
-амавроз
-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні VII пари черепно-мозкових нервів при виході з каналу?

-афонія

-гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

+гемімімія, перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофталм

-гемімімія та порушення слюзовиділення

-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні лицевого нерва в каналі вище відходження chorda tympani?

-гемімімія, перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофталм

-гемімімія та порушення слюзовиділення

-гемімімія та гіперакузія

+гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні VII пари черепно-мозкових нервів у каналі вище відходження n. stapedius?

+гемімімія та гіперакузія

-гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

-гемімімія та порушення слюзовиділення

-аносмія

-аносмія

?

Що спостерігається при ушкодженні VII пари черепно-мозкових нервів у каналі вище відходження n. petrosus major?

-гемімімія та гіперакузія

+гемімімія та порушення слюзовиділення

-гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

-амавроз

-аносмія

?

Що виникає при пошкодженні rr. temporales n. facialis?

-мідріаз

-птоз

+лагофталм

-амавроз

-аносмія

?

Що спостерігається при переломі черепа в ділянці яремного отвору?

-симптом Бера

-синдром Фуа

-синдром Віллара

+синдром Мак-Кензі

-синдром Горнера

?

Що спостерігається при пошкодженні IX пари черепно-мозкових нервів?

+дисфагія, анестезія слизової оболонки глотки, дисгевзія

-афонія та розлад серцевої діяльності

-геміглоссоплегія, дисфагія, дизартрія та девіація язика

-гемімімія та порушення слюзовиділення

-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні X пари черепно-мозкових нервів?

-дисфагія, анестезія слизової оболонки глотки, дисгевзія +афонія та розлад серцевої діяльності

-геміглоссоплегія, дисфагія, дизартрія та девіація язика

-гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

-аносмія

?

Що спостерігається при пошкодженні XI пари черепно-мозкових нервів?

-амавроз

-афонія

+torticollis

-аносмія

-геміглоссоплегія

?

У хворої ушкоджений яремний отвір. Які із зазначених нервів проходять через яремний отвір?

-присінково-завитковий і проміжний

-трійчастий і блукаючий

-під'язиковий і лицевий

+блукаючий, додатковий і язикоглотковий

-під'язиковий, лицевий, трійчастий

?

Що спостерігається при пошкодженні XII пари черепно-мозкових нервів?

+геміглоссоплегія, дисфагія, дизартрія та девіація язика

-дисфагія, анестезія слизової оболонки глотки, дисгевзія

-гемімімія, олігоптіалізм, дисгевзія або агеїзія

-torticollis

-гемімімія, олігоптіалізм

?

Як можна зупинити кровотечу з судин кісток?

-електрокоагуляція, прошивні лігатури, кліпування

+втирання воску, штифтування, електрокоагуляція, роздавлювання кістковими кусачками

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпування, тампонада гемостатичною губкою

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюнінгу-Бурденко, перев'язують

?

Як зупиняють кровотечу з судин твердої мозкової оболонки?

-втирання воску, штифтування, електрокоагуляція, роздавлювання кістковими кусачками

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпування, тампонада гемостатичною губкою

+електрокоагуляція, прошивні лігатури, кліпування

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластиною по Брюнінгу-Бурденко, перев'язують

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

?

Як зупинити кровотечу з судин м'якої мозкової оболонки?

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластикою по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

-тампонада гемостатичною губкою, тампонада мотком кетгуту, за допомогою кровоспинних затискачів

-за допомогою кровоспинних затискачів

+змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпування, тампонада гемостатичною губкою

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

?

Як можна зупинити кровотечу з венозних синусів?

+тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами, пластикою по Брюннгу-Бурденко, перев'язують

-змочення розчином перекису водню, електрокоагуляція, кліпування, тампонада гемостатичною губкою

-тампонада гемостатичною губкою, тампонада мотком кетгуту, за допомогою кровоспинних затискачів

-за допомогою кровоспинних затискачів

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

?

При операції в порожнині черепа ушкоджені синуси твердої мозкової оболонки. Як зупиняють кровотечу із синусів твердої мозкової оболонки по Бурденко?

-тампонадою порожнини шматком м'яза

+прошиванням П подібного шматка зовнішнього листка твердої мозкової оболонки

-тампонадою порожнини кетгутотом

-прошиванням обох кінців синуса лігатурою

-тампонада гемостатичною губкою, ушивають вузловими швами

?

Які внутрішньочерепні гематоми, й в якому просторі, найбільш частіше можуть утворитися при пошкодженні а. meningeae media?

-епідуральний простір і субдуральні гематоми

-субдуральний простір і субдуральні гематоми

+епідуральний простір і епідуральні гематоми

-субдуральний простір і субарахноїдальні гематоми

-Субарахноїдальний простір і епідуральні гематоми

?

У потерпілого черепно-мозкова травма голови внаслідок удару по обличчю. Що спостерігається при переломі основи черепа в ділянці передньої черепної ямки?

-повна офтальмоплегія, витрішкуватість, птоз

-розкосе стояння очних яблук, диплопія

-гемімімія, перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофтальм

+носова кровотеча, лікворея з носу, синці й підшкірна емфізема в ділянці очниці, порушення нюху, пневмоцефалія

-перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофтальм

?

Що спостерігається при переломі основи черепа в ділянці середньої черепної ямки з пошкодженням піраміди скроневої кістки?

+кровотеча, лікворея з наужного слухового проходу та ушкодження VII, VIII пари черепно-мозкових нервів

-афонія та розлад серцевої діяльності

-геміглосопплегія, дисфагія, дизартрія та девіація язика

-гемімімія, порушення слюзовиділення та ушкодження IX, X пари черепно-мозкових нервів

-перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофтальм

?

Проводиться первинна хірургічна обробка рани при черепно-мозковій травмі. Коли поранення голови вважають проникаючими?

-при пошкодженні павутинної мозкової оболонки

+при пошкодженні твердої мозкової оболонки

-при пошкодженні зовнішньої пластинки кістки черепа

-при пошкодженні м'якої мозкової оболонки

-при пошкодженні кістки склепіння

?

Що спостерігається при переломі основи черепа в ділянці задньої черепної ямки?

-кровотеча, лікворея з наужного слухового проходу та ушкодження VII, VIII пари черепно-мозкових нервів

-носова кровотеча, лікворея з носу, синці й підшкірна емфізема в ділянці очниці, порушення нюху, пневмоцефалія

+афонія, дисфагія, кривошия в наслідок пошкодження IX, X та XI пари черепно-мозкових нервів в ділянці яремного отвору

-гемімімія, порушення слюзовиділення та ушкодження IX, X пари черепно-мозкових нервів

-перекіс ротової щілини в здорову сторону, сглаженість носогубної складки, лагофтальм

?

Назвіть межі скроневої ділянки?

+зверху та ззаду - верхня скронева лінія, знизу - вилична дуга, спереду - лобовий відросток виличної кістки та виличний відросток лобової кістки.

-спереду - надочномковий край лобової кістки, ззаду - зовнішній потиличний виступ та верхня каркова лінія, з боків (латерально) - верхня скронева лінія

-зверху - надочномковий край лобової кістки, спереду - зовнішній потиличний виступ та верхня каркова лінія, з боків (латерально) - верхня скронева лінія.

-зверху - лінія, що відповідає продовженню виличної дуги, спереду - лінія прикріплення вушної раковини, знизу та з боків - відповідає обрисом соскоподібного відростка

-межам скроневого м'яза

?

Що розташовано в підшкірній клітковині скроневої ділянки?

-а. v et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major

+m.m. auricularis anterior et superior, a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis, n.

zygomatocotemporalis, a. et v. auricularis posterior, n. occipitalis minor, rr. temporales (n. facialis)

-m. auricularis posterior, a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, лімфатичні судини й вузли
-a., v. et n. supratrochlearis, a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)
-a., v et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, rr. temporales (n. facialis)
?

Скільки шарів жирової клітковини в скроневої ділянці?

-чотири

-три

-шість

+п'ять

-два

?

Де знаходиться поверхнева флегмона скроневої ділянки?

-скронеvim апоневрозом і зовнішньою поверхнею скроневого м'яза

-скронеvim апоневрозом і внутрішньою поверхнею скроневого м'яза

-поверхневим і глибоким листками скроневого апоневрозу

-окістям та кісткою

+між шкірою та поверхневим листком скроневого апоневрозу

?

Назвіть можливі шляхи подальшого поширення інфекції зі скроневої ділянки?

+в підскронеvu ямку, в привушну - жувальну ділянку, в піджувальний простір, в лобову ділянку, в очницю, в скронеvu кістку, в порожнину черепа

-в щічна ділянку, в скронево - крилоподібний та міжкрилоподібний простір, в парафарингіальний простір, привушно - жувальну ділянку

-в щічна ділянку, в парафарингіальний простір, привушно - жувальну ділянку, в порожнину черепа

-в латеральний трикутник шиї, в лобово-тім'яно-потиличну ділянку, в ділянку соскоподібного відростка, в порожнину черепа

-буде обмежене скроневою ділянкою

?

Яким розрізом найчастіше вскривають поверхневі флегмони скроневої ділянки?

-дугоподібним розрізом по ходу нижньої скроневої лінії скроневої кістки

+переднім похилим розрізом позаду лобового відростка виличної кістки

-горизонтальним розрізом над виличною дугою

-заднім вертикальним розрізом через середину запального інфільтрату

-Z - подібним розрізом над виличною дугою

?

Яким розрізом найчастіше вскривають

міжапоневротичні флегмони скроневої ділянки?

-горизонтальним розрізом під виличною дугою

-дугоподібним розрізом по ходу нижньої скроневої лінії скроневої кістки

-заднім вертикальним розрізом через середину запального інфільтрату

+горизонтальним розрізом над виличною дугою

-Z - подібним розрізом над виличною дугою
?

Що проходить у міжапоневротичній клітковині скроневого простору?

-a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis

+a. et v. temporales profundae, глибокі скроневі нерви

-v. retromandibularis

-ductus parotideus

+a. et v. temporalis media, n. zygomaticotemporalis

?

Чим обмежений глибокий скроневий клітковинний простір?

+скронеvim м'язом і окістям

-скронеvim апоневрозом і внутрішньою поверхнею скроневого м'яза

-окістям та кісткою

-скронеvim апоневрозом і зовнішньою поверхнею скроневого м'яза

-поверхневим і глибоким листками скроневого апоневрозу

?

Яким розрізом найчастіше вскривають глибокі флегмони скроневої ділянки?

-горизонтальним розрізом під виличною дугою

+дугоподібним розрізом по ходу нижньої скроневої лінії скроневої кістки

-заднім вертикальним розрізом через середину запального інфільтрату

-двома вертикальними розрізами

-Z - подібним розрізом над виличною дугою

?

Що містить глибокий скроневий клітковинний простір?

-a. et v. temporalis media

-a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis

-a. et v. temporalis superficialis

+a. et v. temporales profundae, глибокі скроневі нерви

-n. auriculotemporalis

?

Які симптоми найбільше часто свідчать про наявність внутрічерепної гематоми?

-дісфагія, анестезія слизової оболонки глотки, дісгевзія

-афонія та розлад серцевої діяльності

-геміглоссоплегія, дісфагія, дизартрія та девіація язика

+мідріаз, геміпарез, брадикардія, наявність "світлого проміжку"

-анестезія слизової оболонки глотки, дісгевзія

?

Що входить до кісткової основи скроневої ділянки?

+велике крило клиноподібної кістки, луска скроневої кістки, частина лобової кістки, частина тім'яної кістки

-мале крило клиноподібної кістки, лобова луска,

лобовий край тім'яної кістки, решітчаста кістка

-скронева кістка, верхня щелепа, вилична кістка, нижня щелепа

-мале крило клиноподібної кістки, лобова луска,

вилична кістка, нижня щелепа, частина лобової кістки

-велике крило клиноподібної кістки, соскоподібний відросток скроневої кістки, частина лобової кістки

?

У чому особливість будови лускової частини скроневої кістки?

- містить повітряноносну пазуху - пневматична будова
- +відсутній губчатий шар - луската будова
- складається з губчатого й компактного шарів - діплоетична будова
- має тришарову будову
- містить комірки

?

До якого анатомічного утворення прикріплюється сухожилки скроневого м'яза?

- до шийки нижньої щелепи
- до виличного відростка верхньої щелепи
- +до гілки та вінцевого відростка нижньої щелепи
- до виросткового відростка
- до частини лобової кістки

?

Назвіть одну з перших ознак запалення клітковини глибокої скроневої ділянки?

- лагофталм
- дисфагія
- +тризм
- афонія та розлад серцевої діяльності
- ригідність м'язів потилиці

?

Що можливо пошкодити при розкритті флегмони скроневої області?

- a., v. et n. supratrochlearis, a., v. et n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)
- a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, лімфатичні судини
- a., v et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major
- m. auricularis posterior, a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, лімфатичні судини й вузли
- +rr temporales n. facialis, rr zygomatici n. facialis, a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis, глибокі скроневі судини й нерви

?

Що розташовано в підшкірній клітковині в ділянці соскоподібного відростка?

- +m. auricularis posterior, a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, лімфатичні судини й вузли
- m.m. auricularis anterior et superior, a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis, n. zygomaticotemporalis, a. et v. auricularis posterior, n. occipitalis minor, rr. temporales (n. facialis)
- a., v et n. auricularis posterior, a. et v. occipitalis, n. occipitalis minor, n. occipitalis major
- a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis
- a. et v. auricularis posterior, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, лімфатичні судини

?

Назвіть передню границю трикутника Шипо?

- crista mastoidea
- шийка нижньої щелепи

- +вертикальна лінія, проведена по задньому краю зовнішнього слухового проходу від верхівки соскоподібного відростка через spina suprameatum
- горизонтальна лінія, що є продовженням виличної дуги
- crista supramastoidea

?

Назвіть задню границю трикутника Шипо?

- горизонтальна лінія, що є продовженням виличної дуги
- вертикальна лінія, проведена по задньому краю зовнішнього слухового проходу від верхівки соскоподібного відростка через spina suprameatum
- +crista mastoidea
- шийка нижньої щелепи
- надсоскоподібний гребінь

?

Назвіть верхню границю трикутника Шипо?

- crista mastoidea
- вертикальна лінія, проведена по задньому краю зовнішнього слухового проходу від верхівки соскоподібного відростка через spina suprameatum
- porus acusticus externus
- шийка нижньої щелепи
- +горизонтальна лінія, що є продовженням виличної дуги

?

Куди може проникнути гній зруйнувавши задню стінку antrum mastoideum?

- +в sinus sigmoideus
- в среднюю черепную ямку
- у задню черепну ямку
- до виличного відростка верхньої щелепи
- у порожнину середнього вуха

?

Куди може проникнути гній зруйнувавши верхню стінку antrum mastoideum?

- в sinus sigmoideus
- +у середню черепну ямку
- до виличного відростка верхньої щелепи
- у задню черепну ямку
- у порожнину середнього вуха

?

Назвіть проекцію центральної (роландової) борозни за схемою Кренлейна?

- від точки перетинання задньої вертикалі з верхньою горизонталлю до точки перетинання передньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- від точки перетинання передньої вертикалі з верхньою горизонталлю до точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- від точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю до точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- +від точки перетинання задньої вертикалі із сагітальною лінією до точки перетинання передньої вертикалі з верхньою горизонталлю
- від точки перетинання передньої вертикалі із сагітальною лінією до точки перетинання передньої вертикалі з нижньою горизонталлю

?

В якому місці за схемою Кронлейна розміщен стовбур а. meningea media?

- перетин верхньої горизонталі і передньої вертикалі
- перетин нижньої горизонталі і середньої вертикалі
- точка перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю до точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- перетин нижньої горизонталі і задньої вертикалі
- +перетин нижньої горизонталі і передньої вертикалі

?

Де за схемою Кронлейна визначається проекція передньої гілки а. meninge media?

- +перетин верхньої горизонталі і передньої вертикалі
- перетин нижньої горизонталі і середньої вертикалі
- точка перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю до точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- перетин нижньої горизонталі і задньої вертикалі
- бісектриса кута, утвореного, проекцією центральної борозни і верхньою горизонталлю

?

Назвіть проекцію латеральної (сильвієвої) борозни за схемою Кронлейна?

- перетин верхньої горизонталі і передньої вертикалі
- точка перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю до точки перетинання задньої вертикалі з нижньою горизонталлю
- +бісектриса кута, утвореного, проекцією центральної борозни і верхньою горизонталлю
- перетин нижньої горизонталі і середньої вертикалі
- перетин нижньої горизонталі і задньої вертикалі

?

Через який отвір проникає в порожнину черепа а. meninge media?

- через foramen rotundum
- через foramen ovale
- +через foramen spinosum
- через foramen lacerum
- через foramen jugularis

?

Якій звивині мозку відповідає хід передньої гілки середньої оболонкової артерії?

- зацентральної звивині
- кутової звивині
- +передцентральної звивині
- нижньої скроневої звивині
- верхньої скроневої звивині

?

Якій звивині (частці мозку) відповідає хід задньої гілки середньої оболонкової артерії?

- передцентральної звивині
- зацентральної звивині
- нижньої скроневої звивині
- тім'яної частці
- +скроневої частці

?

Які тканини входять до складу першого шматка при кістково-пластичній трепанації черепа способом Олівекрона?

- +шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз

- шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз, підапоневротична клітковина, окістя, кістка
- шкіра, підшкірна клітковина, м'яз, окістя, кістка
- шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз, підапоневротична клітковина
- шкіра, підшкірна клітковина

?

Які тканини входять до складу другого шматка при кістково-пластичній трепанації черепа способом Олівекрона?

- шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз
- +м'яз, окістя, кістка
- шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз, підапоневротична клітковина, м'яз, окістя, кістка
- шкіра, підшкірна клітковина, апоневроз, підапоневротична клітковина
- шкіра, підшкірна клітковина

?

Яка судина прилягає зсередини до скроневої кістки?

- temporalis profunda
- a., v et n. auricularis posterior
- a.cerebri media
- +a.meningia media
- a.cerebri anterior

?

Якими розрізами вскривають флегмони скроневої ділянки?

- двома вертикальними розрізами
- внутрішньоротовим
- по верхньому або нижньому краю очниці
- Z - подібним розрізом над виличною дугою
- горизонтальним розрізом під виличною дугою
- +переднім похилим розрізом, заднім вертикальним розрізом, горизонтальним розрізом над виличною дугою

?

Які із зазначених способів відносяться до декомпресійної трепанації черепа?

- +по Кушингу
- по Вагнерові-Вольфові
- по Олівекрону
- по Бохарду
- по Лекснеру

?

У хворой з підвищеним внутрічерепним тиском показана декомпресійна трепанація черепа. Де її роблять?

- у правій тім'яній ділянці
- +у правій скроневої ділянці
- у лівій тім'яній ділянці
- у потиличній ділянці зліва
- у правій та лівій потиличній ділянці

?

Хворому за показниками роблять трепанацію соскоподібного відростка. Які із зазначених спеціальних інструментів використовують при трепанації соскоподібного відростка?

- кусачки Лістона
- кусачки Дальгрена
- +стамеску Воячека або желобовате долото
- кусачки Дуайєна
- Кусачки Л'юера

?

Яке ускладнення при трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо під час операції була порушена передня границя трепанаційного трикутника Шипо?

-центральний параліч n. facialis на стороні протилежної операції

-ушкодження внутрішнього вуха

-ушкодження сигмовидної пазухи і кровотечі з неї

-ушкодження верхньої сагітальної пазухи і кровотечі з неї

+периферичний параліч n. facialis на стороні операції

?

Яке ускладнення при трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо під час операції була порушена верхня границя трепанаційного трикутника Шипо?

+внесення інфекції в порожнину черепа

-периферичний n. facialis параліч на стороні операції

-центральний параліч n. facialis на стороні протилежної операції

-центральний параліч n. facialis на стороні операції

-ушкодження верхньої сагітальної пазухи і кровотечі з неї

?

Яке ускладнення при трепанації соскоподібного відростка може виникнути в післяопераційному періоді, якщо під час операції була порушена задня границя трепанаційного трикутника Шипо?

-периферичний параліч n. facialis на стороні операції

+ушкодження сигмовидної пазухи і кровотечі з неї

-ушкодження верхньої сагітальної пазухи і кровотечі з неї

-внесення інфекції в порожнину черепа

-ушкодження внутрішнього вуха

?

Назвіть межі бічної ділянки обличчя?

+зверху - вилична дуга та нижній край очної ямки, знизу

- нижній край основи нижньої щелепи, спереду - носогубна та носо-щічна складки і ззаду - задній край гілки нижньої щелепи

-спереду - надочномковий край лобової кістки, ззаду - зовнішній потиличний виступ та верхня каркова лінія, з боків (латерально) - верхня скронева лінія

-зверху - лінія, що відповідає продовженню виличної дуги, спереду - лінія прикріплення вушної раковини, знизу та з боків - відповідає обрисом соскоподібного відростка

-зверху та ззаду - верхня скронева лінія, знизу - вилична дуга, спереду - лобовий відросток виличної кістки та виличний відросток лобової кістки

-знизу - надочномковий край лобової кістки, спереду - зовнішній потиличний виступ та верхня каркова лінія, зверху (латерально) - верхня скронева лінія.

?

Чим іннервується шкіра щічної ділянки?

-n. zygomaticotemporalis, n. auriculotemporalis, n. auricularis magnus, rr. buccalis (від n. facialis)

+n. zygomaticofacialis, n. buccalis (від n. mandibularis), n. infraorbitalis, n. mentalis

-n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior

-n. supratrochlearis, n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

-n. auriculotemporalis, n. auricularis magnus, rr. buccalis (від n. facialis)

?

Що розміщено ззовні й попереду від жирового тіла щоки?

-arcus zygomaticus

-галузь нижньої щелепи

-жувальний м'яз

+стенонова протока

-m. buccinator

-a. occipitalis

?

Яка артерія супроводжує ductus parotideus?

-a. temporalis media

-a. facialis

-a. occipitalis

-a. temporalis superficialis

+a. transversa faciei

?

Назвіть відростки жирового тіла щоки.

+скроневий, очномковий, крилопіднебінний

-скроневий, очномковий, вінцевий

-носовий, очномковий, крилопіднебінний

-піджувальний, очномковий, крилопіднебінний

-очномковий, нижньощелепний, крилопіднебінний

?

Які клітковинні простори зв'язує між собою жирове тіло щоки?

-клітковину щічної області, міжкрилоподібний

-скроневокрилоподібний, підапоневротичний простір скроневої області

+всі перелічені

-клітковину крилопіднебінної ямки

-клітковину очниці

?

Чим іннервується m. depressor labii inferioris?

-n. mentalis

-n. infraorbitalis

+r. marginalis mandibulae

-n. mylohyoideus

-n. auriculotemporalis

?

У хворого при обстеженні рани бічної поверхні обличчя, відсутній пульс на лицьовій артерії. Де пальпують пульсацію лицьової артерії?

-вище вушної раковини

-позаду вушної раковини

-біля мочки вуха

-біля козелка вуха

+біля переднього краю жувального м'яза у нижнього края нижньої щелепи

?

Назвіть вени по яких можливий ретроградний потік крові й перенесення інфекції при фурункулах м'яких тканин лицевого черепа в печеристий синус?

+v. facialis -> v. angularis -> vv. ophthalmicae -> sinus cavernosus; або v. facialis -> v. faciei profunda -> plexus pterygoideus -> v. emissaria foraminis laceri -> plexus venosus foraminis ovale -> sinus cavernosus
-v. facialis -> v. temporalis superficialis -> v. auricularis posterior -> v. jugularis externa
-v. facialis -> v. supratrochlearis, -> v. supraorbitalis, -> vv. ophthalmicae
-v. facialis -> v. temporalis superficialis -> sinus cavernosus; або v. facialis -> v. auricularis posterior -> v. jugularis externa
-v. facialis -> v. supratrochlearis, -> v. supraorbitalis -> v. faciei profunda -> plexus pterygoideus

?

Назвіть проекцію підчочномкового судинно-нервового пучка?

-на 0,5 см нижче точки, розташованої між медіальної середнього третьою нижнього очномкового краю
+на 0,5 см нижче середини нижнього очномкового краю
-на 0,5 см вище точки, розташованої між медіальної середнього третьою нижнього очномкового краю
-по вертикальній лінії, проведеної через медіальний кут ока
-на 1,0 см назовні від крила носа

?

Назвіть проекцію підборідного судинно-нервового пучка?

-в області кута рота
-на 0,5 см нижче точки, розташованої між медіальної середнього третьою нижнього очномкового краю
-на середині basis mandibulae
+на одній вертикалі з надчочномковим і підчочномковим отворами
-у переднього краю m. masseter

?

Назвіть проекцію надчочномкового судинно-нервового пучка?

-на середині margo supraorbitalis
-на 0,5 см вище точки, розташованої між медіальної середнього третьою нижнього очномкового краю
-у точці перетину вертикальної лінії, проведеної через медіальний кут ока з margo supraorbitalis
-на 0,5 см вище середини margo supraorbitalis
+на границі між медіальною й середньою третьою margo supraorbitalis

?

Чим іннервується шкіра привушно-жувальної ділянки?

+n. zygomaticofacialis, n. buccalis (від n. mandibularis), n. auriculotemporalis, n. auricularis magnus
-n. buccalis (від n. mandibularis), n. infraorbitalis, n. mentalis
-n. auriculotemporalis, n. auricularis magnus, rr. buccalis (від n. facialis)
-n. auricularis magnus, n. supratrochlearis, n. supraorbitalis
-n. auricularis magnus, n. supratrochlearis, n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)

?

Що розташовано в підшкірній клітковині привушно-жувальної області?

-m.m. auricularis anterior et superior, a. et v. temporalis superficialis, n. auriculotemporalis
+n. auricularis magnus, a. et v. transversa faciei, гілки n. facialis, n. auriculotemporalis
-n. auricularis magnus, n. supratrochlearis, n. supraorbitalis
-n. zygomaticotemporalis, a. et v. auricularis posterior, n. occipitalis minor, rr. temporales (n. facialis)
-a., v et n. buccalis (від n. mandibularis), n. infraorbitalis, n. mentalis

?

Назвіть передню межу spatium parotideum?

-m. pterygoideus lateralis
-підщелепна слинна залоза
-гілка нижньої щелепи
+задня й зовнішня поверхня m. masseter, гілка нижньої щелепи, m. pterygoideus medialis
-шилоподібний відросток, m. stylohyoideus, m. styloglossus, m. stylopharyngeus, клітковина переднього парафарингеального простору

?

Назвіть нижню межу spatium parotideum?

-задня й зовнішня поверхня m. masseter, гілка нижньої щелепи, m. pterygoideus medialis
-шилоподібний відросток, m. stylohyoideus, m. styloglossus, m. stylopharyngeus, клітковина переднього парафарингеального простору
-m. sternocleidomastoideus, заднє черевце m. digastricus, соскоподібний відросток
+підщелепна слинна залоза
-гілка нижньої щелепи

?

Назвіть задню межу spatium parotideum?

+m. sternocleidomastoideus, заднє черевце m. digastricus, соскоподібний відросток
-задня й зовнішня поверхня m. masseter, гілка нижньої щелепи, m. pterygoideus medialis
-діафрагма Жонеско
-гілка нижньої щелепи
-шилоподібний відросток, m. stylohyoideus, m. styloglossus, m. stylopharyngeus, клітковина переднього парафарингеального простору

?

Назвіть медіальну межу spatium parotideum?

-підшкірна жирова клітковина
-гілка нижньої щелепи
+шилоподібний відросток, m. stylohyoideus, m. styloglossus, m. stylopharyngeus, клітковина переднього парафарингеального простору
-зовнішній слуховий прохід
-задня й зовнішня поверхня m. masseter, гілка нижньої щелепи, m. pterygoideus medialis

?

Назвіть латеральну межу spatium parotideum?

-m. sternocleidomastoideus, заднє черевце m. digastricus, соскоподібний відросток
-задня й зовнішня поверхня m. masseter, гілка нижньої щелепи, m. pterygoideus medialis
+підшкірна жирова клітковина

-гілка нижньої щелепи
 -m. pterygoideus lateralis
 ?
 Назвіть верхню межу spatium parotideum.
 -основа черепа
 -гілка нижньої щелепи
 -ala major ossis sphenoidale
 -вилична дуга
 +зовнішній слуховий прохід
 ?
 Що проходить через gl. parotis?
 +a. carotis externa, v. retromandibularis, n. facialis, n. auriculotemporalis
 -a. carotis interna, v. jugularis interna, v. jugularis externa, v. facialis
 -a., v et n. buccalis (від n. mandibularis), n. infraorbitalis, n. mentalis
 - v. jugularis interna, v. jugularis externa, v. facialis, n. supratrochlearis, n. supraorbitalis
 -n. auricularis magnus, n. supratrochlearis, n. supraorbitalis, rr. temporales (n. facialis)
 ?
 Назвіть гілки n. facialis до входу в gl. parotis?
 -rr. temporales, n. auriculotemporalis, n. buccalis
 +n. auricularis posterior, r. stylohyoideus, r. digastricus
 -rr. temporales, rr. zygomatici, rr. buccales, marginalis mandibulae, r. colli
 -rr. parotidei, rr. labiales, rr. mentales
 -marginalis mandibulae, r. colli, n. auriculotemporalis, n. buccalis
 ?
 Назвіть гілки pes anserinus major?
 -rr. parotidei, rr. labiales, rr. mentales
 -n. auricularis posterior, r. stylohyoideus, r. digastricus
 +rr. temporales, rr. zygomatici, rr. buccales, r. marginalis mandibulae, r. colli
 -rr. temporales, n. auriculotemporalis, n. buccalis
 -marginalis mandibulae, r. colli, n. auriculotemporalis, n. buccalis
 ?
 Назвіть проекційну лінію скроневих гілок лицевого нерва?
 -від соскоподібного відростка до медіального кута ока
 -від соскоподібного відростка до кута рота
 -по вертикальній лінії, проведеної попереду від козелка вушка
 -від мочки вуха до зовнішнього кута носу
 +від мочки вуха до зовнішнього кута ока
 ?
 Назвіть проекційну лінію крайової гілки нижньої щелепи?
 +на 0,5-1 см нижче нижнього краю нижньої щелепи
 -на 0,5-1 см вище від мочки вуха до латерального кута рота
 -на 1 см нижче й паралельно виличної дуги
 -від соскоподібного відростка до медіального кута ока
 -від зовнішнього слухового проходу до точки, розміщеної на середині відстані між крилом носа й кутом рота
 ?

Назвіть проекційну лінію вивідної протоки привушної слинної залози?
 -на 0,5-1 см вище мочки вуха до крила носа
 -від соскоподібного відростка до медіального кута ока
 +від зовнішнього слухового проходу до точки, розміщеної на середині відстані між крилом носа й кутом рота
 -на 1 см нижче й паралельно до нижнього краю нижньої щелепи
 -від мочки вуха до зовнішнього кута ока
 ?
 Які тканини розсікають при гнійному паротиті?
 -шкіру
 -стенонову протоку
 -підшкірну клітковину
 +всі перераховані
 -фасцію привушної залози
 ?
 Які тканини розсовують тупо при гнійному паротиті?
 -підшкірну клітковину
 -шкіру
 -мімічні м'язи
 -фасцію залози
 +паренхіму залози
 ?
 Назвіть можливі ускладнення при розрізах із приводу гнійного паротиту?
 +все перераховане
 -пошкодження зовнішньої сонної артерії та v. retromandibularis
 -пошкодження гілок n. facialis
 -n. auriculotemporalis
 -інфікування рани
 ?
 Після травми в області дна порожнини рота у хворого розвилися рухові розлади м'язів мови. Який нерв міг бути ушкоджений у пацієнта?
 -язичний нерв
 +під'язичний нерв
 -язикоглотковий нерв
 -блукаючий нерв
 -барабанна струна
 ?
 Назвіть сфінктер Стенонової протоки?
 -Одди
 -Міріці
 -m.massester
 +m.buccinator
 -медіальний крилоподібний м'яз
 ?
 Назвіть волокна врисбергова нерва.
 -n.petrosus minor
 n.canalis pterygoidei
 -n.tympanicus, n.stapedius
 -нема вірної відповіді
 +n.petrosus major, chorda tympani
 ?
 Назвіть частину рухових волокон лицевого нерва, які відходять у фалопієвому каналі?
 +n.stapedius
 -n.petrosus major

-n.canalis pterygoidei
-n.petrosus minor
-chorda tympani
?

Як називається за автором, вивідна протока привушної залози?

-Вартонова
+Стенонова
-Бартолинова
-Вальтеран
-Вірсгунова
?

У хворого внаслідок залучення в запальний процес відбувся тромбоз лицьової вени. По якій вені тромб із лицьової вени може прямо потрапити в систему внутрічерепних пазух і вен?

-v. jugularis interna
-v. jugularis externa
+v. angularis
-v. facialis
-v. transversa faciei
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір зовні?

-m. pterygoideus lateralis
-m.m. auricularis anterior et superior
-m. pterygoideus medialis
-m. masseter
+m. temporalis
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір медіально?

+m. pterygoideus lateralis
-m. pterygoideus medialis
-m.m. auricularis anterior et superior
-гілка нижньої щелепи
-lamina lateralis processus pterygoideus
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір позаду?

-m. sternocleidomastoideus
+processus condylaris mandibulae
-соскоподібний відросток
-m.m. auricularis anterior et superior
-заднє черевце m. digastricus
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір попереду?

-m. masseter
-гілка нижньої щелепи
-m.m. auricularis anterior et superior
+tuber maxillae
-m. temporalis
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір зверху?

-вилична дуга
-m.m. auricularis anterior et superior
-tuber maxillae
-зовнішній слуховий прохід
+нижня поверхня великого крила клиноподібної кістки
?

Чим обмежений скронево-крилоподібний простір знизу?

+переходить у міжкрилоподібний
-m. pterygoideus lateralis
-m.m. auricularis anterior et superior
-m. pterygoideus medialis
-підщелепна залоза
?

Назвіть вміст скронево-крилоподібного простору?

-n. maxillaris, n. mandibularis, v. retromandibularis
+plexus pterygoideus, nn. temporales profundi, n. massetericus, n. buccalis, a. maxillaris
-m. pterygoideus lateralis, m. pterygoideus medialis, підщелепна залоза
-plexus pterygoideus, a. auricularis profunda
-a. tympanica anterior, a. alveolaris inferior, a. meningeal media
?

Назвіть гілки I відділу a. maxillaris?

-a. masseterica, a. buccalis, a. alveolaris superior posterior
+a. auricularis profunda, a. tympanica anterior, a. alveolaris inferior, a. meningeal media
-a. masseterica, aa. pterygoideus medialis et lateralis
-aa. temporales profundae, a. buccalis, a. alveolaris superior posterior
- a. alveolaris inferior, a. meningeal media, a. alveolaris superior posterior
?

Назвіть гілки другого відділу a. maxillaris?

+a. masseterica, aa. pterygoideus medialis et lateralis, aa. temporales profundae, a. buccalis, a. alveolaris superior posterior
-a. meningeal media, a. alveolaris inferior, palatina descendens
-a. buccalis, a. alveolaris superior posterior, a. meningeal media, a. alveolaris superior posterior
-a. alveolaris inferior, a. meningeal media, a. alveolaris superior posterior
-a. auricularis profunda, a. tympanica anterior, a. alveolaris inferior, a. meningeal media
?

Назвіть гілки третього відділу a. maxillaris?

-a. masseterica, a. buccalis, a. meningeal media, a. alveolaris inferior
-a. alveolaris superior posterior
-a. masseterica, aa. pterygoideus medialis et lateralis, aa. temporales profundae, a. buccalis, a. alveolaris superior posterior
+a. palatina descendens, a. infraorbitalis, a. sphenopalatina
-a. auricularis profunda, a. tympanica anterior, a. alveolaris inferior, a. meningeal media
?

Назвіть зовнішню межу міжкрилоподібного простору?

-m. pterygoideus medialis
-m. temporalis
-m. masseter
-m.m. auricularis anterior et superior
+гілкою нижньої щелепи, m. pterygoideus lateralis

?

Чим обмежений міжкрилоподібний простір зсередини?

- +m. pterygoideus medialis
- m.m. auricularis anterior et superior
- m. pterygoideus lateralis
- lamina lateralis processus pterygoideus
- гілкою нижньої щелепи, m. pterygoideus lateralis

?

Чим обмежений міжкрилоподібний простір зверху?

- m. pterygoideus medialis
- m.m. auricularis anterior et superior
- +основною черепа
- m. pterygoideus lateralis
- зовнішнім слуховим проходом

?

Чим обмежений міжкрилоподібний простір позаду?

- гілкою нижньої щелепи, m. pterygoideus lateralis
- m. sternocleidomastoideus
- +привушною залозою
- m.m. auricularis anterior et superior
- venter posterior m. digastricus

?

Назвіть передню межу міжкрилоподібного простору?.

- m. pterygoideus medialis
- m. pterygoideus lateralis
- m.m. auricularis anterior et superior
- m. masseter
- +жирове тіло щоки, tuber maxillae

?

Назвіть вміст міжкрилоподібного простору?

- +n. mandibularis, a. maxillaris, plexus pterygoideus
- жирова клітковина, n. maxillaris, a. maxillaris, ganglion pterygopalatinum
- m. pterygoideus lateralis, m. temporalis
- a. auricularis profunda, a. tympanica anterior, a. alveolaris inferior, a. meningea media
- n. mandibularis, v. retromandibularis, glandula parotis

?

Назвіть передню стінку fossa pterygopalatina?

- processus pterygoideus
- +tuber maxillae
- m. masseter
- venter posterior m. digastricus
- гілка нижньої щелепи

?

Назвіть задню стінку fossa pterygopalatina?

- glandula parotis
- tuber maxillae
- +processus pterygoideus
- venter posterior m. digastricus

-гілка нижньої щелепи

?

Назвіть медіальну стінку fossa pterygopalatina?

- processus pterygoideus
- tuber maxillae
- venter posterior m. digastricus
- lamina lateralis processus pterygoideus
- +lamina perpendicularis ossis palatini

?

У що переходить донизу fossa pterygopalatina?

-підскроневу ямку

-foramen spinosus

+canalis palatinus major

-canalis pterygoideus

-скронево-крилоподібний простір

?

Назвіть вміст fossa pterygopalatina?

- n. mandibularis, a. maxillaris, plexus pterygoideus
- m. pterygoideus lateralis, m. temporalis
- n. mandibularis, v. retromandibularis, glandula parotis
- +жирова клітковина, n. maxillaris, a. maxillaris, ganglion pterygopalatinum
- n. mandibularis, v. retromandibularis, glandula parotis

?

Через який отвір у черепі проникає в крилопіднебінну ямку n. maxillaris?

- foramen ovale
- foramen spinosus
- fissura orbitalis superior
- +foramen rotundum
- canalis pterygoideus

?

Назвіть гілки n. maxillaris?

- +n. zygomaticus, n. infraorbitalis, nn. pterygopalatini
- n. supraorbitalis, n. auriculotemporalis, n. lingualis
- n. alveolaris inferior, n. lingualis
- rr. nasales, rr. labiales superiores, n. lingualis
- nn. palpebrales inferiores, rr. nasales, rr. labiales superiores

?

Назвіть гілки pes anserinus minor?

- rr. temporales, rr. zygomatici
- rr. buccales, r. marginalis mandibulae, r. colli
- +nn. palpebrales inferiores, rr. nasales, rr. labiales superiores
- n. zygomaticus, n. infraorbitalis, nn. pterygopalatini
- n. supraorbitalis, n. auriculotemporalis, n. lingualis

?

Чим обмежений передній парафарінгеальний простір зсередини?

- m. pterygoideus medialis
- m.m. auricularis anterior et superior
- m. pterygoideus lateralis
- +m. levator velli palatini, m. tensor velli palatini, m. constrictor pharyngis superior, fascia pharyngobasilaris, піднебінна мигдалина
- перегородка Шарпи

?

Чим обмежений передній парафарінгеальний простір ззовні?

- m. pterygoideus lateralis
- m.m. auricularis anterior et superior
- m. levator velli palatini, m. tensor velli palatini, m. constrictor pharyngis superior, fascia pharyngobasilaris, піднебінна мигдалина
- m. temporalis
- +m. pterygoideus medialis

?

Чим обмежений передній парафарінгеальний простір позаду?

+aponeurosis stylopharyngeus

-m.m. auricularis anterior et superior

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

-m. levator velli palatini, m. tensor velli palatini, m. constrictor pharyngis superior, fascia pharyngobasilaris, піднебінна мигдалина

-m. sternocleidomastoideus

?

Назвіть верхню межу переднього парафарінгеального простору?

-зовнішній слуховий прохід

+основа черепа

-m.m. auricularis anterior et superior

-діафрагма Жонеско

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

?

Назвіть нижню межу переднього парафарінгеального простору?

-aponeurosis stylopharyngeus

-m.m. auricularis anterior et superior

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

+капсула підщелепної слинної залози

-gl. parotis

?

Назвіть вміст переднього парафарінгеального простору?

-n. mandibularis, a. carotis interna, v. jugularis interna

-a. carotis interna, v. jugularis interna

-n. vagus, n. accessorius

-все перераховане

+a. palatina ascendens, vv. pharyngea, pl. pharyngeus

?

Чим обмежений задній парафарінгеальний простір зсередини?

+перегородкою Шарпі

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

-шилоподібним відростком, м'язами анатомічного букета Ріолана (m. stylopharyngeus, m. styloglossus, m. stylohyoideus), aponeurosis stylopharyngeus

-предхребтова фасція

-aponeurosis stylopharyngeus

?

Чим обмежений задній парафарінгеальний простір ззовні?

-m. pterygoideus medialis

+шилоподібний відросток, m. digastricus, m. sternocleidomastoideus

-m. pterygoideus lateralis

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

-m. masseter

?

Назвіть задню стінку заднього парафарінгеального простору?

-aponeurosis stylopharyngeus

-шилоподібний відросток, m. digastricus, m. sternocleidomastoideus gl. parotis

+предхребтова фасція

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

-перегородка Шарпі

?

Назвіть передню стінку заднього парафарінгеального простору?

-tuber maxillae

-aponeurosis pharyngoprevertebralis

-предхребтова фасція

-aponeurosis stylopharyngeus

+шилоподібний відросток, м'язи анатомічного букета Ріолана (m. stylopharyngeus, m. styloglossus, m. stylohyoideus), aponeurosis stylopharyngeus

?

Назвіть вміст заднього парафарінгеального простору?

+все перераховане

-a. carotis interna, v. jugularis interna

-n. glossopharyngeus, n. vagus

-n. accessorius, n. hypoglossus

-верхній шийний вузол truncus sympathicus

?

Назвіть автора екстраоральної анестезії верхньо- і нижньощелепних нервів?

-Лукашевич-Оберест

+Вайсблат

-Бернар-Горнер

-Куленкамппф

-Брауну-Усольцевой

?

Які судини проходять у товщі передньої стінки гайморової пазухи?

-a. infraorbitalis

-palatina ascendens

-a. carotis interna, v. jugularis interna

+aa. alveolares superiores anteriores

-palatina descendens

?

Які судини прилягають до задньої стінки гайморової пазухи?

-a. facialis

-a. palatina ascendens

-a. sphenopalatina

-a. carotis interna, v. jugularis interna

+a. infraorbitalis, a. palatina descendens, a. alveolaris superior posterior

?

Що проходить у товщі верхньої стінки гайморової пазухи?

+підчочномковий нерв і артерія

-надчочномковий нерв і артерія

-a. et v. angularis

-a. carotis interna, v. jugularis interna

-a. et v. sphenopalatina

?

Назвіть найрозповсюдженіший метод гайморотомії при хронічному гаймориті?

-Кілліана

-Бернара-Горнера

+Колдуелла-Люка-Іванова

-Ріттера-Янсена

-Лімберга

?

Яким методом найчастіше розкривають лобову пазуху при гнійному її запаленні?

-Колдуелла-Люка-Іванова

-Кіллиана

-Бернара-Горнера

+Ріттера-Янсена

-Лімберга

?

У хворого з гайморитом з'явився пекучий біль у бічній області обличчя, ринорея, слюзотеча, слинотеча, набряк і гіперемія повік. Про яке ускладнення можна думати?

-повна офтальмоплегія, витрішкуватість, птоз, синдром Фуа

-синдром Мак-Кензи

-синдром Віллара

-синдром -Бернара-Горнера

+гангліоневрит крилопіднебінного вузла, синдром

Сладера

?

Де розміщений піджувальний клітковинний простір?

+між гілкою нижньої щелепи й жувальним м'язом

-між зовнішнім крилоподібним і жувальним м'язами

-між внутрішнім крилоподібним і жувальним м'язами

-між щічним і жувальним м'язами

-між щічним і зовнішнім крилоподібним

?

Що знаходиться в піджувальному клітковинному просторі?

-a. et v. masseterica i n.buccalis

+n.massetericus, a. et v. masseterica

-r.marginalis mandibulae

-a. et v. angularis

-нема вірної відповіді

?

Яке анатомічне утворення з'єднує скронево крилоподібний простір із клітковиною крилопіднебінної ямки?

-foramen rotundum

-fissura orbitalis superior

+fissura pterygomaxillaris

-foramen ovale

-fissura orbitalis inferior

?

Яке анатомічне утворення з'єднує скронево крилоподібний простір із клітковиною очниці?

-fissura orbitalis superior

-canalis pterygoideus

-foramen rotundum

-fissura pterygomaxillaris

+fissura orbitalis inferior

?

Які анатомічні утворення з'єднують скронево - крилоподібний простір з порожниною черепа?

+foramen ovale i foramen spinosum

-foramen rotundum i fissura orbitalis superior

-fissura orbitalis inferior

-canalis pterygoideus

-fissura pterygomaxillaris

?

Які анатомічні утворення з'єднують скронево крилоподібний простір з піджувальним простором?

-a. maxillaris

+a. et v. masseterica

-foramen ovale

-canalis pterygoideus

-fissura orbitalis superior

-fissura orbitalis inferior

?

Яке анатомічне утворення з'єднує скронево - крилоподібний простір з ложем привушної залози?

-ductus parotideus

-fissura pterygomaxillaris

+a. maxillaris

-fissura orbitalis superior

-fissura orbitalis inferior

?

Що з'єднує клітковину переднього парафарінгеального простору з ложем привушної залози?

-fissura pterygomaxillaris

-ductus parotideus

-a. maxillaris

+глотковий відросток gl. parotis

-fissura orbitalis inferior

?

Які анатомічні утворення з'єднують клітковину заднього парафарінгеального простору з верхнім середостінням?

+a. carotis interna, v. jugularis interna i n. vagus

-n. accessorius

-n. hypoglossus

-n. glossopharyngeus

-v. jugularis externa

?

Яке анатомічне утворення з'єднує клітковину заднього парафарінгеального простору із заднім середостінням?

-стравохід

+n. vagus

-n. hypoglossus

-v. jugularis externa

-глотка

?

Які анатомічні утворення з'єднують клітковину заднього парафарінгеального простору з spatium vasonervorum?

-n. glossopharyngeus i n. accessorius

-v. jugularis externa

-n. glossopharyngeus

+a. carotis interna, v. jugularis interna i n. vagus

-n. auriculotemporalis

?

Яке анатомічне утворення з'єднує клітковину заднього парафарінгеального простору із задньою черепною ямкою?

-a. carotis interna

-a. vertebralis

-n. glossopharyngeus

-n. facialis

+v. jugularis interna

?

Яке анатомічне утворення з'єднує клітковину заднього парафарінгеального простору із середньою черепною ямкою?

- +a. carotis interna
- v. jugularis interna
- n. glossopharyngeus
- n. vagus
- n. Facialis

?

Назвіть верхню границю сонного трикутника:

- +заднє черевце m. digastricus
- грудинно-ключично-соскоподібний м'яз
- переднє черевце m. digastricus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- лопатково-під'язиковий м'яз (верхнє черевце)

?

Чим обмежений сонний трикутник ззовні?

- заднє черевце m. digastricus
- +m. sternocleidomastoideus
- верхнє черевце m. omohyoideus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- лопатково-під'язиковий м'яз (верхнє черевце)

?

Чим обмежений сонний трикутник знизу?

- нижнє черевце m. omohyoideus
- m. sternocleidomastoideus
- +верхнє черевце m. omohyoideus
- заднє черевце m. digastricus
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть верхню границю trigonum omotracheale:

- m. sternocleidomastoideus
- +переднє черевце m. digastricus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- верхнє черевце m. digastricus
- верхнє черевце m. omohyoideus
- заднє черевце m. digastricus

?

Назвіть зовнішню стінку trigonum omotracheale:

- +m. sternocleidomastoideus
- верхнє черевце m. omohyoideus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- переднє черевце m. digastricus
- заднє черевце m. digastricus

?

Назвіть медіальну границю trigonum omotracheale:

- верхнє черевце m. omohyoideus
- +серединна лінія шиї
- переднє черевце m. digastricus
- m. sternocleidomastoideus
- заднє черевце m. digastricus

?

Назвіть границю trigonum omotrapezoideum ззаду:

- m. sternocleidomastoideus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- +m. trapezius
- заднє черевце m. digastricus
- верхнє черевце m. omohyoideus

?

Назвіть границю trigonum omotrapezoideum зпереду:

- верхнє черевце m. omohyoideus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- заднє черевце m. digastricus
- +m. sternocleidomastoideus
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть границю omotrapezoideum знизу:

- +нижнє черевце m. omohyoideus
- заднє черевце m. digastricus
- m. trapezius
- m. sternocleidomastoideus
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть верхню границю trigonum omoclaviculare:

- верхнє черевце m. omohyoideus
- +нижнє черевце m. omohyoideus
- заднє черевце m. digastricus
- m. sternocleidomastoideus
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть передню границю trigonum omoclaviculare:

- серединна лінія шиї
- нижнє черевце m. omohyoideus
- +m. sternocleidomastoideus
- ключиця
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть нижню границю trigonum omoclaviculare:

- m. sternocleidomastoideus
- нижнє черевце m. omohyoideus
- m. trapezius
- +ключиця
- переднє черевце m. digastricus

?

Назвіть фасції піднижньощелепного трикутника:

- +fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae
- lamina superficialis fascia colli propriae
- lamina profunda fascia colli propriae, fascia colli superficialis
- fascia endocervicalis, fascia prevertebralis

?

Назвіть фасції сонного трикутника:

- fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, lamina profunda fascia colli propriae, fascia endocervicalis
- +fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, fascia endocervicalis, fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, lamina profunda fascia colli propriae, fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae
- lamina profunda fascia colli propriae, fascia endocervicalis, fascia prevertebralis

?

Назвіть фасцію, якої нема в trigonum omotracheale:

- fascia colli superficialis
- fascia endocervicalis
- +fascia thoracolumbalis
- fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis

?

Назвіть фасції trigonum omotracheoideum:

- fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, lamina profunda fascia colli propriae
- fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, fascia endocervicalis
- fascia colli superficialis, fascia endocervicalis, fascia prevertebralis
- lamina superficialis fascia colli propriae, lamina profunda fascia colli propriae
- +fascia colli superficialis, lamina superficialis fascia colli propriae, fascia prevertebralis

?

Назвіть фасцію, якої нема в trigonum omoclaviculare:

- +fascia endocervicalis
- fascia colli superficialis
- fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis
- lamina superficialis fascia colli propriae

?

Яка фасція утворює футляр для m. platysma:

- lamina superficialis fascia colli propriae
- +fascia colli superficialis
- fascia prevertebralis
- lamina profunda fascia colli propriae
- fascia endocervicalis

?

Яка фасція утворює футляр для грудинно-ключично-соскоподібного м'яза:

- fascia prevertebralis
- lamina profunda fascia colli propriae
- +lamina superficialis fascia colli propriae
- fascia colli superficialis
- fascia endocervicalis

?

Яка фасція утворює капсулу піднижньощелепної залози:

- lamina profunda fascia colli propriae
- fascia colli superficialis
- fascia endocervicalis
- fascia prevertebralis
- +lamina superficialis fascia colli propriae

?

Яка фасція утворює піхву м'язів, розміщених нижче під'язикової кістки?

- +lamina profunda fascia colli propriae
- lamina superficialis fascia colli propriae
- fascia colli superficialis
- fascia prevertebralis
- fascia endocervicalis

?

Яка фасція утворює піхву судинно-нервового пучка шиї?

- вісцеральний листок t. endocervicalis
- +парієтальний листок внутрішньошийної фасції
- fascia prevertebralis

- lamina profunda fascia colli propriae
- lamina superficialis fascia colli propriae

?

Яка фасція утворює піхву драбинчастих м'язів?

- fascia endocervicalis
- парієтальний листок t. endocervicalis
- +fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis
- lamina profunda fascia colli propriae

?

Яка фасція утворює піхву a. et. v. subclavia i plexus brachialis?

- парієтальний листок t. endocervicalis
- вісцеральний листок t. endocervicalis
- lamina profunda fascia colli propriae
- +fascia prevertebralis
- fascia colli superficialis

?

Що знаходиться в надгрудинному міжпоневротичному просторі?

- +arcus venosus juguli
- v. jugularis anterior
- v. jugularis externa
- a. subclavia
- v. jugularis interna

?

Який клітковинний простір розміщений між листками другої і третьої фасцій шиї над яремною вирізкою груднини?

- сліпий мішок Грубера
- +spatium interaponeuroticum suprasternale
- spatium pretracheale
- spatium vasonervorum
- spatium retroviscerale

?

Яким розрізом розкривають флегмону надгрудинного міжпоневротичного простору?

- по серединній лінії шиї
- розріз ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
- +поперечним розрізом вище від яремної вирізки груднини

-уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Який клітковинний простір знаходиться позаду грудинно-ключично-соскоподібного м'яза між II і III фасціями шиї?

- spatium interaponeuroticum suprasternale
- spatium pretracheale
- spatium retroviscerale
- +сліпий мішок Грубера
- spatium vasonervorum

?

Який клітковинний простір знаходиться між парієтальним і вісцеральним листками IV фасції шиї?

- +spatium previscerale
- spatium retroviscerale
- spatium vasonervorum
- spatium prevertebrale

-сліпий мішок Грубера
?

Що знаходиться в spatium pretracheale?

-plexus venosus thyroideus impar, a. subclavia, a. thyroidea ima, truncus brachiocephalicus, thymus plexus venosus thyroideus impar n. phrenicus
+plexus venosus thyroideus impar, a. thyroidea ima, truncus brachiocephalicus, a. carotis communis dextra, thymus

-a. thyroidea ima, truncus brachiocephalicus, thymus

-a. thyroidea ima, truncus brachiocephalicus, thymus plexus venosus thyroideus impar n. phrenicus

-plexus venosus thyroideus impar, a. thyroidea ima, truncus brachiocephalicus, a. subclavia, n. phrenicus

?

Яким розрізом розкрити флегмону переднотрощового клітковинного простору?

-по серединній лінії шиї

-розрізом Де Кервена

+поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки груднини

-розрізом Кюттнера

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Яким розрізом розкрити піднижньощелепну флегмону?

-розріз починають на рівні верхнього краю щитоподібного хряща і продовжують до переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-розрізом Кохера

+відступивши на 2 см від краю нижньої щелепи

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Яким розрізом розкрити флегмону грудинно-ключично-соскоподібного м'яза (Бетцольдієвського абсцесу):

+розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза над припухлістю

-розрізом Кохера

-поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки

-розріз починають від верхнього краю щитоподібного хряща і продовжують по серединній лінії шиї

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Яким розрізом розкрити флегмону бічного трикутника шиї?

-розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

+розріз виконують над ключицею паралельно їй від заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза до переднього краю трапецієподібного м'яза

-розріз виконують під ключицею, пошарово розсікають шкіру, підшкірну клітковину, підшкірний м'яз

-дугоподібним розрізом Кюттнера

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Яким розрізом розкрити флегмону позадуниотрощового клітковинного простору?

-розріз виконують по серединній лінії шиї

-поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки груднини

+розріз починають на рівні верхнього краю щитоподібного хряща і продовжують по передньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-розрізом Кохера

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Як розкрити флегмону клітковинного простору судинно-нервового пучка?

-розрізом Кохера

-поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки

-розріз виконують над ключицею паралельно їй від заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза до переднього краю трапецієподібного м'яза

+доступ виконують по передньому або задньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-уздовж заднього краю підшкірного м'яза

?

Що знаходиться в клітковині бічного трикутника між II і V фасціями шиї?

+v. jugularis externa, n. accessorius, nn. supraclavicularis, a. et v. cervicalis superficialis

-v. jugularis externa, n. accessorius, nn. supraclavicularis, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. suprascapularis

-v. jugularis externa, a. et v. subclavia, plexus brachialis n. accessorius, nn. supraclavicularis

-v. jugularis externa, a. et v. subclavia, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. cervicalis suprascapularis, n. accessorius

-a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. cervicalis suprascapularis, n. accessorius

?

Що знаходиться в клітковині бічного трикутника між III і V фасціями шиї?

-v. jugularis externa, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. cervicalis suprascapularis, n. accessorius

+v. jugularis externa, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. suprascapularis

-v. jugularis externa, a. et v. cervicalis superficialis, n. accessorius, mm. scaleni anterior, medius et posterior

-v. jugularis externa, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. suprascapularis, a. et v. subclavia, plexus brachialis

-a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. cervicalis suprascapularis, n. accessorius

?

Що знаходиться під V фасцією в tr. omoclavulare:

-a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. suprascapularis

-a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. cervicalis superficialis

+a. et v. subclavia, plexus brachialis

-a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. suprascapularis

-a. et v. cervicalis superficialis, a. et v. suprascapularis

?

Що знаходиться в spatium prevertebrale?

-mm. longus colli, mm. longus capitis, a. et v. subclavia

-mm. longus colli, mm. longus capitis, a. et v. subclavia, pl. brachialis

-mm. longus colli, mm. longus capitis, truncus sympathicus, pl. brachialis

+mm. longus colli, mm. longus capitis, truncus sympathicus

-a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. cervicalis

superficialis, a. et v. suprascapularis

?

Що проходить в підшкірній клітковині

піднижньощелепного трикутника?

+n. transversus colli

-n. transversus colli, r. marginalis mandibulae

-n. transversus colli, r. marginalis mandibulae, v. jugulis externa

-n. transversus colli, r. marginalis mandibulae, a. et v.

facialis

-a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. cervicalis

superficialis, a. et v. suprascapularis

?

Що знаходиться під поверхневим листком II фасції шиї в піднижньощелепному трикутнику:

-a. et v. facialis, glandula submandibularis, n. mylohyoideus, n. transversus colli, a. et v. submental

+r. marginalis mandibulae, v. facialis, a. facialis, a. et v.

submental, n. mylohyoideus, лімфатичні узли, glandula submandibularis

-a. et v. facialis, r. marginalis mandibulae, a. et v.

submental

-a. et v. facialis, r. marginalis mandibulae, glandula

submandibularis, a. et v. submental

--a. et v. subclavia, plexus brachialis, a. et v. cervicalis

superficialis, a. et v. suprascapularis

?

Назвіть можливі шляхи розповсюдження гною з ретровісцерального простору:

-в spatium vasonervorum і верхнє середостіння

-в spatium interscalenum і бічний трикутник шиї

+в заглотковий простір і верхнє середостіння

-в spatium antescalenum і верхнє середостіння

-в сліпий мішок Грубера

?

Які клітковинні простори сполучаються з верхнім середостінням?

-spatium vasonervorum, spatium previscerale, spatium prevertebrale

-spatium previscerale, spatium retroviscerale

+spatium vasonervorum, spatium previscerale, spatium retroviscerale

-spatium vasonervorum, spatium previscerale, spatium retroviscerale, spatium prevertebrale, сліпий мішок

Грубера

-spatium antescalenum, spatium prevertebrale

?

Чим обмежене ложе піднижньощелепної залози зверху?

-m. mylohyoideus, m. hyoglossus

-m. mylohyoideus і заднім черевцем m. digastricus

-привушна слинна залоза

-переднє і заднє черевце m. digastricus

+fossa submandibularis нижньої щелепи

?

Чим обмежене ложе піднижньощелепної залози знизу?

+переднє і заднє черевце m. digastricus

-m. mylohyoideus і заднім черевцем m. digastricus

-fossa submandibularis нижньої щелепи

-m. mylohyoideus, m. hyoglossus

-n. hypoglossus

?

Чим обмежене ложе піднижньощелепної залози ззаду?

-fossa submandibularis нижньої щелепи

-m. mylohyoideus і заднім черевцем m. digastricus

+привушна слинна залоза

-m. mylohyoideus

-заднє черевце m. digastricus

?

Чим обмежене ложе піднижньощелепної залози медіально?

-привушна слинна залоза

-m. mylohyoideus і заднім черевцем m. digastricus

-fossa submandibularis нижньої щелепи

+m. mylohyoideus, m. hyoglossus

-переднє і заднє черевце m. digastricus

?

Між якими м'язами проходить вивідна протока піднижньощелепної залози?

-m. mylohyoideus і заднім черевцем m. digastricus

-m. mylohyoideus і переднім черевцем m. digastricus

-m. mylohyoideus і m. constrictor pharyngis medius

-m. hyoglossus і m. constrictor pharyngis medius

+m. mylohyoideus і m. hyoglossus

?

Що проходить безпосередньо вище від протоки піднижньощелепної залози?

+n. lingualis

-n. hypoglossus

-блукуючий нерв

-a. lingualis

-v. lingualis

?

Що проходить нижче протоки піднижньощелепної залози?

-n. lingualis

-блукуючий нерв

+n. hypoglossus, v. lingualis

-a. lingualis

-r. marginalis mandibulae

?

Що є орієнтиром для визначення язикової артерії?

-Вартонов проток

-Стенонова протока

-заднє черевце m. digastricus

+трикутник Пирогова

-n. hypoglossus

?

Що служить провідником гною, з'єдную дно порожнини рота з ложем піднижньощелепної залози?

-Стенонов проток

-n. lingualis

-n. hypoglossus

-r. marginalis mandibulae

+Вартонова протока і передній відросток gl.

submandibularis

?

Чим кровопостачається gl. submandibularis?

+rr. glandulares a. facialis, a. sublingualis a lingualis

-a. palatina ascendens

-a. submentalialis, a. facialis

-a. facialis

- a. pharyngea ascendens

?

Що знаходиться під глибоким листком 2-й фасції шиї в піднижньощелепному трикутнику?

-Вартонов проток, n. lingualis, n. hypoglossus, a. lingualis

+передній відросток піднижньощелепної залози,

Вартонов проток, n. hypoglossus, v. lingualis, n. lingualis

-Вартонов проток, a. lingualis, n. hypoglossus, передній відросток gl. submandibularis, v. lingualis

-Стенонов проток, n. hypoglossus, n. lingualis, v. lingualis, a. lingualis

-rr. glandulares a. facialis, a. sublingualis a lingualis

?

Чим обмежений піднижньощелепний трикутник зверху?

-переднє черевце m. digastricus

-m. mylohyoideus і переднім черевцем m. digastricus

-задній край m. sternocleidomastoideus

+нижній край нижньої щелепи

-заднє черевце m. digastricus

?

Чим обмежений піднижньощелепний трикутник зпереду?

-заднє черевце m. digastricus

-нижній край нижньої щелепи

-m. mylohyoideus

-задній край m. sternocleidomastoideus

+переднє черевце m. digastricus

?

Чим обмежений піднижньощелепний трикутник ззаду?

+заднє черевце m. digastricus

-m. mylohyoideus і переднім черевцем m. digastricus

-нижнє черевце m. omohyoideus

-передній край m. sternocleidomastoideus

-переднє черевце m. digastricus

?

Які м'язи утворюють дно піднижньощелепного трикутника?

-заднє черевце m. digastricus

-переднє черевце m. digastricus

+m. mylohyoideus, m. hyoglossus

-m. stylohyoideus, m. mylohyoideus

-m. hyoglossus, m. digastricus

?

Назвіть межі трикутника Пирогова зпереду:

-сухожилок m. digastricus

-переднє черевце m. digastricus

-n. hypoglossus

+m. mylohyoideus

-m. hyoglossus

?

Назвіть межі трикутника Пирогова знизу:

-m. mylohyoideus

-n. hypoglossus

-m. hyoglossus

+сухожилок m. digastricus

?

Назвіть межі трикутника Пирогова зверху:

+n. hypoglossus, v. lingualis

-сухожилок m. digastricus

-переднє черевце m. digastricus

-m. mylohyoideus

-m. hyoglossus

?

Назвіть дно трикутника Пирогова:

-m. mylohyoideus

-переднє черевце m. digastricus

+m. hyoglossus

-m. constrictor pharyngis medius

-m. stylohyoideus

?

Між якими м'язами проходить a. lingualis в трикутнику Пирогова?

-між m. mylohyoideus і m. hyoglossus

-між m. constrictor pharyngis inferior і m. hyoglossus

-між m. constrictor pharyngis superior і m. hyoglossus

+між m. hyoglossus і m. constrictor pharyngis medius

-між m. digastricus і m. mylohyoideus

?

Що необхідно зробити, щоб знайти a. lingualis в трикутнику Пирогова?

-відводить m. digastricus

-видалити підщелепну слинну залозу

-розтинають m. mylohyoideus

-відтягують n. hypoglossus

+тупим шляхом розсувають волокна m. hyoglossus

?

Як називається по автору вивідна протока піднижньощелепної слинної залози?

+Вартонова протока

-Стенонова протока

-Вірзунгов проток

-Боталов проток

-Аранцієва протока

?

Що проходить в підшкірній клітковині сонного трикутника?

-r. marginalis mandibulae, n. transversus colli

+n. transversus colli, r. colli n. facialis

-v. jugularis externa, n. transversus colli

-nn. supraclavicularis, n. transversus colli

-r. colli n. facialis, v. jugularis externa

?

Що проходить між I і II фасціями шиї в клітковині сонного трикутника?

-n. transversus colli, r. colli n. facialis, r. marginalis mandibulae

-n. transversus colli, nn. supraclavicularis, v. jugularis externa

+n. transversus colli, r. colli n. facialis, v. jugularis externa

-n. transversus colli, rr. colli n. facialis, r. marginalis mandibulae, v. jugularis externa

?

Що входить в склад основного судинно-нервового пучка шиї?

-v. jugularis externa, a. carotis communis, n. vagus
-v. jugularis externa, a. carotis communis, r. marginalis mandibulae

-v. jugularis interna, a. carotis interna, n. vagus
+v. jugularis interna, a. carotis communis, n. vagus
-v. jugularis interna, a. carotis communis, n. phrenicus
?

Який з елементів основного судинно-нервового пучка шиї розміщений поверхнево і назовні?

+v. jugularis interna
-a. carotis communis
-n. vagus
-r. marginalis mandibulae
-v. jugularis externa
?

Назвіть притоки v. jugularis interna в сонному трикутнику:

-v. temporalis superficialis, v. facialis communis
-v. thyreoidea superior v. lingualis
-v. facialis, v. lingualis, v. retromandibularis, v. thyreoidea superior
+v. facialis communis, v. lingualis, v. thyreoidea superior, vv. pharyngeae
-v. facialis, v. lingualis, vv. pharyngeae, v. jugularis externa
?

Що відходить від блукаючого нерва в сонному трикутнику?

-rr. laryngeus recurrens, rr. cardiaci superiores, rr. pharyngei
-rr. cardiaci superior, n. transversus colli, n. laryngeus superior
-nn. supraclaviculares, n. laryngeus superior, rr. cardiaci superiores
+rr. pharyngei, n. laryngeus superior, rr. cardiaci superiores
-n. transversus colli, nn. supraclavicularis
?

З яких рецепторних утворень складається каротидна рефлексогенна зона?

+sinus caroticus, glomus caroticum
-sinus caroticum
-glomus caroticum
-sinus caroticum, glomus caroticum, arcus aortae
-truncus pulmonalis
?

Які нерви беруть участь в утворенні рефлексогенної зони?

-n. glossopharyngeus, n. vagus, truncus sympathicus, n. phrenicus
+n. glossopharyngeus, n. vagus, truncus sympathicus Відієв нерв, Врізбергов нерв
-n. vagus, truncus sympathicus
-rr. laryngeus recurrens, rr. cardiaci superiores, rr. pharyngei
-rr. cardiaci superior, n. transversus colli, n. laryngeus superior
?

Яку операцію роблять при важкій формі бронхіальної астми?

-Ванаха
+Накаями

-Люїса
-Колдуела-Люка
-Ріттера-Янсена
?

Який м'яз прикриває загальну сонну артерію в межах сонного трикутника?

-m. sternocleidomastoideus
-m. sternohyoideus
-m. omohyoideus
+m. platysma
-m. hyoglossus
?

Назвіть проекційну лінію загальної сонної артерії:

+від грудинно-ключичного сполучення до середини відстані між кутом нижньої щілини і соскоподібним відростком
-від яремної вирізки до кута нижньої щелепи
-від яремної вирізки до гілки нижньої щелепи
-від яремної вирізки до соскоподібного відростка
-від грудинно-ключичного сполучення до кута нижньої щелепи
?

Що проходить між I і II фасціями шиї в грудинно-ключично-соскоподібній ділянці:

-v. jugularis externa, n. transversus colli, n. auricularis magnus, a. cervicalis superficialis, n. occipitalis minor
+v. jugularis externa, n. transversus colli, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, nn. supraclaviculares
-v. jugularis externa, n. transversus colli, r. colli n. facialis, nn. supraclavicularis, n. occipitalis minor
-v. jugularis externa, a. cervicalis superficialis
-n. occipitalis minor, nn. supraclaviculares, n. auricularis magnus
?

Що проходить по передній стінці загальної сонної артерії:

-n. phrenicus, серцеві гілки симпатичного стовбура, radix superior n. hypoglossus
-n. accessorius, серцеві гілки симпатичного стовбура
+radix superior n. hypoglossus, серцеві гілки блукаючого нерва серцеві гілки симпатичного стовбура
-radix superior n. hypoglossus, серцеві гілки блукаючого нерва і симпатичного стовбура, a. cervicalis ascendens
-radix superior n. hypoglossus, n. accessorius, серцеві гілки симпатичного стовбура
?

Що знаходиться під IV фасцією шиї зпереду і ззовні від v. jugularis interna і a. carotis communis в середній третині грудинно-ключично-соскоподібній ділянці:

-n. accessorius
-n. transversus colli
-a. et v. cervicalis superficialis
+ansa cervicalis
-radix superior n. hypoglossus

?

Назвіть гілки шийного сплетення:

+n. transversus colli, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, nn. supraclaviculares, n. phrenicus

-n. transversus colli, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. occipitalis major, nn. supraclaviculares

-n. transversus colli, n. suprascapularis, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. phrenicus

-n. transversus colli, n. occipitalis minor, n. auricularis posterior, nn. supraclaviculares, n. phrenicus

-n. suprascapularis, n. auricularis magnus, n. occipitalis minor, n. phrenicus

?

Де знаходиться верхній шийний симпатичний вузол симпатичного стовбура?

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з II - IV шийних хребців позаду внутрішньої сонної артерії зпереду від n. vagus

+на m. longus capitis на рівні поперекових відростків з II - IV шийних хребців ззаду внутрішньої сонної артерії медіально від n. vagus

-на m. longus capitis на рівні поперекових відростків з II - IV шийних хребців ззаду від внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з II - IV шийних хребців зпереду внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з III - VI шийних хребців зпереду внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

?

Де знаходиться середній шийний вузол симпатичного стовбура?

-на m. longus capitis на рівні поперекових відростків з II - IV шийних хребців ззаду від внутрішньої сонної артерії

-на m. longus colli на рівні VI шийного хребця ззаду внутрішньої сонної артерії медіально від n. vagus

+на m. longus colli на рівні VI шийного хребця над дугою a. thyroidea inferior

-на m. longus capitis на рівні VI шийного хребця зпереду a. vertebralis

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з III - VI шийних хребців зпереду внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

?

Де знаходиться проміжний шийний вузол симпатичного стовбура?

-ззаду хребтової артерії на рівні головки I ребра

- ззаду внутрішньої сонної артерії на рівні головки I ребра

-зпереду a. subclavia на рівні головки I ребра

+на передній поверхні хребтової артерії на рівні VII шийного хребця

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з III - VI шийних хребців зпереду внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

?

Де знаходиться нижній шийний вузол симпатичного стовбура?

+в драбинчасто-хребтовому трикутнику на рівні головки I ребра позаду хребтової артерії позаду a. subclavia медіально truncus thyreocervicalis

-в драбинчасто-хребтовому трикутнику на рівні VII шийного хребця зпереду від хребтової артерії

латерально thyreocervicalis

-в spatium antescalenum на рівні головки I ребра зпереду a. vertebralis латерально truncus thyreocavicalis

-в драбинчасто-хребтовому трикутнику на рівні головок I ребра зпереду a. vertebralis медіально truncus thyreocervicalis

-на m. longus colli на рівні поперекових відростків з III - VI шийних хребців зпереду внутрішньої сонної артерії назовні від n. vagus

?

Що спостерігається при шийному остеохондрозі внаслідок здавлення хребтової артерії і симпатичного сплетення?

-синдром Фуа

+синдром Барре-Льеу

-синдром Горнера

-синдром Делафуа

-синдром Вілларе

?

Чим проявляється синдром Барре-Льеу?

-болі і парастезії в ділянці голови і шиї, torticollis, птоз, мідріаз

-болі і парастезії в ділянці голови і шиї, анізокорія, екзофтальм, зниження гостроти зору

+болі і парастезії в ділянці голови і шиї, запаморечення, шум у вухах, зниження гостроти зору

-болі і парастезії в ділянці голови і шиї, запаморечення, птоз, екзофтальм

-анізокорія, екзофтальм, зниження гостроти зору

?

Що спостерігається при подразненні симпатичних волокон в ділянці шиї?

-синдром Барре-Льїу

-синдром Вілларе

-синдром Фуа

-синдром Делафуа

+синдром Пті

?

Чим проявляється синдром Пті?

+екзофтальм, мідріаз, розширення глазної щілини

-енофтальм, міоз, звуження глазної щілини

-анізокорія, екзофтальм, зниження гостроти зору

-екзофтальм, міоз, розширення глазної щілини

-екзофтальм, torticollis, мідріаз

?

Що спостерігається при пошкодженні симпатичного стовбура на шиї?

-синдром Фуа

+синдром Горнера-Клода Бернара

-синдром Вілларе

-синдром Делафуа

-синдром Барре-Льїу

?

Чим проявляється синдром Горнера-Клода Бернара?

-мідріаз, розширення очної щілини, гіперемія обличчя, брадикардія

-анізокорія, екзофтальм, зниження гостроти зору

-міоз, екзофтальм, тахикардія, розширення очної щілини, гіперемія обличчя

+міоз звуження очної щілини, енофтальм, гіперемія обличчя, брадикардія

-мідріаз, звуження очної щілини, западіння очного яблука, тахикардія

?

Куди вводиться розчин новокаїну при вагосимпатичній блокаді за О.В.Вишневським?

-у клітковину, оточуючу нижній шийний вузол

симпатичного стовбура, петлю В'єссана, n. phrenicus

-у клітковину оточуючу верхній шийний вузол

симпатичного стовбура, n. phrenicus, шийне сплетення

-у клітковину, оточуючу верхній шийний вузол

симпатичного стовбура, шийне сплетення, n. vagus, n. phrenicus

+у клітковину, оточуючу верхній шийний вузол

симпатичного стовбура, truncus sympathicus, n. vagus

-у клітковину оточуючу нижній шийний вузол

симпатичного стовбура, n. phrenicus, шийне сплетення

?

Чим обмежений spatium antescalenum зпеду і ззовні?

+m. sternocleidomastoideus, m. omohyoideus

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus

-m. scalenus anterior, m. omohyoideus

-m. sternocleidomastoideus, m. scalenus anterior

-m. scalenus anterior, m. omohyoideus

?

Чим обмежений spatium antescalenum зпеду і медіально?

-m. sternocleidomastoideus, m. omohyoideus

+m. sternohyoideus, m. sternothyroideus

-m. sternocleidomastoideus, m. sternohyoideus

-m. sternohyoideus, m. scalenus anterior

-m. scalenus anterior, m. omohyoideus

?

Чим обмежений spatium antescalenum ззаду?

-m. scalenus medius

-m. scalenus posterior

+m. scalenus anterior

-m. longus colli

-m. omohyoideus

?

Назвіть вміст spatium antescalenum:

-bulbus v. jugularis interna

-v. subclavia

-v. jugularis interna, v. subclavia, n. phrenicus

-a. cervicalis ascendens, a. suprascapularis

+bulbus v. jugularis interna, v. subclavia,

ductusmthoracicus, зліва, v. vagus, a. carotis

communis, m. phrenicus, a. cervicalis, ascendens, a.

suprascapularis, m. a. cervicalis superficialis

?

Де проектується на шкіру n. phrenicus?

+в точці Гено Де Мюссі, в малій надключичній ямці, між ніжками грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-у spatium antescalenum

-в великій надключичній ямці

-у spatium interscalenum

-у trigonum scalenovertbrale

?

Що проходить медіально від n. phrenicus по передній поверхні m. scalenus anterior?

-a. suprascapularis

+a. cervicalis ascendens

-a. cervicalis superficialis

-a. thyroidea inferior

-v. jugularis interna

?

Що проходить зпеду n. phrenicus?

-ansa subclavia

-a. cervicalis ascendens, a. suprascapularis

+a. suprascapularis, a. cervicalis superficialis

-ansa cervicalis

-v. jugularis interna

?

Чим обмежений драбинчасто-хребтовий трикутник ззовні?

-m. scalenus medius

-m. scalenus posterior

-m. sternocleidomastoideus

+m. scalenus anterior

-m. longus colli

?

Чим обмежений драбинчасто-хребтовий трикутник медіально?

+m. longus colli

-m. sternocleidomastoideus

-m. sternohyoideus

-m. omohyoideus

-m. scalenus posterior

?

Чим обмежений драбинчасто-хребтовий трикутник знизу?

-ключицею

+купол плеври

-грудиною

-m. scalenus posterior

-m. scalenus anterior

?

Чим обмежений драбинчасто-хребтовий трикутник зпеду?

-m. scalenus anterior

-m. sternocleidomastoideus

+V фасція шиї

-m. sternohyoideus

-m. scalenus posterior

?

Назвіть верхівку драбинчасто-хребтового трикутника:

-купол плеври

-m. sternocleidomastoideus

-m. omohyoideus

+tuberculum caroticum

-m. scalenus posterior

?

Назвіть вміст драбинчасто-хребтового трикутника?

-a. et v. subclavia, середній, проміжний і нижній вузли симпатичного стовбура, v. vertebralis, ductus thoracicus

-a. subclavia, v. jugularis interna, a. carotis communis, n. vagus, середній, проміжний і нижній вузли truncus sympaticus

-n. vagus, середній, проміжний і нижній вузли truncus sympaticus

-v. jugularis interna, v. subclavia, ductus thoracicus, n. vagus, n. phrenicus

+a. subclavia, середній, проміжний і нижній вузли симпатичного стовбура, v. vertebralis, грудна лімфатична протока, зліва

?

Назвіть місце вкола голки для провідникової анестезії шийного сплетення:

+середина заднього краю m. sternocleidomastoideus

-середина переднього краю m. trapezius

-в точці Гено Де Мюссі

-у великій надключичній ямці

-між ніжками грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

?

Що проходить медіально від truncus thyreocervicalis, пересікая a. subclavia?

-n. phrenicus

+n. vagus

-v. jugularis interna

-v. vertebralis

-ductus thoracicus

?

Що проходить латерально від truncus thyreocervicalis, пересікая a. subclavia?

-n. vagus

-v. jugularis interna

+n. phrenicus

-a. thyreoidea inferior

-v. vertebralis

?

Що знаходиться біля основи truncus thyreocervicalis?

-ansa cervicalis

-glomus caroticum

-ductus thoracicus

-v. vertebralis

+ansa subclavia

?

Назвіть гілки підключичної артерії в драбинчасто-хребтовому трикутнику:

+a. vertebralis, truncus thyreocervicalis, a. thoracica interna

-a. vertebralis, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis superficialis

-a. vertebralis, a. transversa colli, a. thoracica interna

-truncus thyreocervicalis, a. transversus colli, a. thyreoidea inferior

-a. thyreidea superior, a. thoracica interna, a. vertebralis, a. cervicalis superficialis

?

Що знаходиться позаду і медіально a. vertebralis?

-v. vertebralis

+ganglion stellatum

-ganglion cervicale intermedium

-n. laryngeus recurrens

-v. vertebralis

?

Назвіть гілки truncus thyreocervicalis:

-a. thyreidea superior, a. thoracica interna, a. vertebralis, a. cervicalis superficialis

-a. vertebralis, a. thyreidea inferior, a. cervicalis superficialis, a. suprascapularis

+a. thyreidea inferior, a. cervicalis ascendens, a. cervicalis superficialis, a. suprascapularis

-a. transversa colli, a. thyreidea inferior, a. suprascapularis, a. thoracica interna

-a. transversus colli, a. thyreidea inferior

?

Чим утворена передня стінка spatium interscalenum?

-m. scalenus medius

-m. scalenus posterior

-m. sternocleidomastoideus

+m. scalenus anterior

-m. longus colli

?

Чим утворена задня стінка spatium interscalenum?

+m. scalenus medius

-m. scalenus posterior

-m. scalenus anterior

-m. sternocleidomastoideus

-m. longus colli

?

Чим утворена нижня стінка spatium interscalenum?

-m. scalenus anterior

+І ребром

-ключиця

-m. longus colli

-m. sternocleidomastoideus

?

Що проходить у spatium interscalenum?

-v. subclavia, n. vagus

-a. et v. subclavia, plexus brachialis

+a. subclavia, plexus brachialis

-v. jugularis interna, n. vagus, a. carotis communis

-a. transversus colli, a. thyreidea inferior

?

Назвіть гілки a. subclavia у spatium interscalenum:

-truncus thyreocervicalis

-a. transversus colli

-a. vertebralis, a. thoracica interna

+truncus costocervicalis

-a. transversus colli, a. thyreidea inferior

?

Назвіть гілки truncus costocervicalis:

+a. cervicalis profunda, a. intercostalis suprema

-a. cervicalis superficialis, a. suprascapularis

-a. cervicalis ascendens, a. cervicalis superficialis, a. transversa colli

-a. cervicalis profunda, a. cervicalis superficialis

-a. transversus colli, a. thyreidea inferior

?

Назвіть автора анестезії плечового сплетення:

-Лукашевич

+Куленкамф

-Оберст

-Пті
-Браун
?
Назвіть точку вколу та напрям голки при блокаді плечового сплетення:
-голку проводять на 1 - 1,5 см нижче середини ключиці латерально і вниз
-голку проводять над серединою ключиці латерально і вниз
+голку проводять над серединою ключиці медіально і вниз, спрямовуючи до II грудного хребця
-голку проводять на 1 - 1,5 см нижче середини ключиці медіально і вниз
-голку проводять на 2 - 2,5 см вище середини ключиці медіально і вгору
?
Який нерв перетинає зовнішню поверхню внутрішньої яремної вени у верхній третині грудинно-ключично-соскоподібної ділянки?
-n. hypoglossus
-n. laryngeus superior
-ansa cervicalis
-n. laryngeus recurrens
+n. accessorius
?
Який нерв перетинає зовнішню поверхню внутрішньої яремної вени у середній третині грудинно-ключично-соскоподібної ділянки?
+radix inferior plexus cervicalis
-radix superior plexus cervicalis
-n. hypoglossus
-n. laryngeus recurrens
-n. accessorius
?
Де з'являється грудна лімфатична протока на рівні apertura thoracis superior:
-ззаду стравоходу попереду від a. subclavia
-попереду від a. subclavia, a. carotis communis, v. jugularis interna
-попереду від v. jugularis interna, a. carotis communis
+у лівого краю стравоходу за a. subclavia
-у правого краю стравоходу за a. subclavia
?
Що розташовано спереду від грудної протоки?
-a. et v. vertebralis
-купол плеври, a. et v. subclavia
-a. transversus colli, a. thyreoidea inferior
-a. carotis interna, v. jugularis interna, купол плеври
+a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus
?
Назвіть місце вколу голки при виконанні провідникової анестезії шийного сплетення:
-точка Гено де Мюсі
+точка Ерба
-голку проводять на 2 - 2,5 см вище середини ключиці медіально і вгору
-на середині заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
-на середині переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного краю
?

Де знаходиться місце вколу голки при проведенні вагосимпатичної блокади?
-на середині переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
-крапка Ерба
-голку проводять на 2 - 2,5 см вище середини ключиці медіально і вгору
+кут, утворений перетином зовнішньої яремної вени із заднім краєм грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
-крапка Гено де Мюсі
?
Що проходить між II і V фасціями шиї в tr. omotracheoideum?
-a. et v. suprascapularis
-a. et v. subclavia, plexus brachialis
-a. et v. cervicalis ascendens, n. phrenicus
+a. et v. cervicalis superficialis, гілки шийного сплетення, n. accessorius
-a. transversus colli, a. thyreoidea inferior
?
Що проходить між III і V фасціями шиї в tr. omoclaviculare?
+a. et v. suprascapularis
-a. et v. cervicalis ascendens
-n. accessorius
-n. phrenicus, a. cervicalis ascendens
-a. transversus colli, a. thyreoidea inferior
?
Що розташовано під V фасцією в tr. omoclaviculare?
-a. et v. suprascapularis
-a. et v. cervicalis superficialis
+a. et v. subclavia, pl. brachialis
-a. et v. suprascapularis, a. et v. cervicalis superficialis, n. accessorius
-a. transversus colli, a. thyreoidea inferior
?
Що розташовано медіально від першого відділу правої підключичної артерії?
-v. jugularis interna
-купол плеври
+трахея, a. carotis communis
-n. vagus
-a. thyreoidea inferior
?
Що розташовано знизу від першого відділу підключичної артерії?
+купол плеври
-І ребро
-ключиця
-v. subclavia
-a. thyreoidea inferior
?
Що розташовано попереду від першого відділу підключичної артерії?
-a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis interna
-v. subclavia, n. vagus, truncus sympathicus
+венозний кут Пирогова, n. vagus, n. phrenicus
-купол плеври
-a. transversus colli, a. thyreoidea inferior

?

Що розташовано позаду від першого відділу правої підключичної артерії?

- +n. laryngeus recurrens
- венотний кут Пирогова
- n. vagus, n. phrenicus
- трахея
- a. thyroidea inferior

?

Які м'язи прикривають щитоподібну залозу:

- +m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. omohyoideus
- m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus
- m. sternohyoideus, m. sternothyroideus
- m. sternocleidomastoideus, m. digastricus
- m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, переднє черевце

?

Яким хрящом трахеї відповідає перешийок щитоподібної залози?

- 2-3
- +2-4
- 3-4
- 1-4
- 4-5

?

Які органи охоплюють частини щитоподібної залози:

- трахею, глотку, гортань
- прищитоподібні залози, a. carotis communis, n. vagus
- трахею, глотку, стравохід
- +трахею, глотку, гортань, стравохід
- трахею, стравохід

?

Що розташовано за щитоподібною залозою:

- прищитоподібні залози, a. carotis communis, n. vagus
- прищитоподібні залози, a. thyroidea inferior, n. vagus
- прищитоподібні залози, a. thyroidea inferior, thymus
- +прищитоподібні залози, a. thyroidea inferior, n. laryngeus recurrens
- v. jugularis interna

?

Що прилягає до задньо-медіальної поверхні щитоподібної залози:

- +n. laryngeus recurrens
- прищитоподібні залози, a. carotis communis, n. vagus
- a. carotis communis
- n. vagus
- v. jugularis interna

?

Що прилягає до задньо-латеральної поверхні щитоподібної залози:

- прищитоподібні залози
- прищитоподібні залози, a. carotis communis, n. vagus
- +a. carotis communis
- a. thyroidea inferior
- v. jugularis interna

?

Яка небезпека підстерігає хірурга на етапі перев'язки нижньої щитоподібної артерії?

- захопити в лігатуру блукаючий нерв
- ушкодити загальну сонну артерію
- ушкодити зовнішню сонну артерію
- +захопити в лігатуру поворотний гортанний нерв
- видалити прищитоподібні залози

?

Які ускладнення можуть виникнути при повному видаленні щитоподібної залози?

- мікседема
- синдром Пті
- Базедова хвороба
- синдром Клода Бернара-Горнера
- +асфіксія, гипопаратиреоз

?

Назвіть автора дугоподібного розрізу на шиї:

- +Кюттнер
- Де Кервен
- Петровський
- Крайл
- Пті

?

Назвіть автора кутового розрізу на шиї:

- Петровський
- +Де Кервен
- Пті
- Крайл
- Кюттнер

?

Назвіть авторів Т-подібних розрізів на шиї:

- Де Кервен, Кюттнер
- Крайл, Де Кервен
- Пті, Люїс
- +Петровський, Крайл
- Петровський, Кюттнер

?

Як виконують розріз Кюттнера?

- починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
- біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до переднього краю трапецієподібного м'яза
- починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
- біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза
- розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
- поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки грудини пошарово проникають до III і IV фасцій шиї, які тупо розділяють
- +починають від заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза на 2 см нижче від соскоподібного відростка,

пересікають грудинно-ключично-соскоподібний м'яз і по його передньому краю доводять до яремної вирізки груднини ?

Як виконують розріз Де Кервена?

+розріз починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад уздовж ключиці до переднього краю трапецієподібного м'яза

-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза

-розріз починають від заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза на 2 см нижче від соскоподібного відростка, ведуть із пересіканням грудинно-ключично-соскоподібного м'яза і по передньому його краю доводять до яремної вирізки груднини

-розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-поперечним розрізом на 2 см вище від яремної вирізки груднини пошарово проникають до III і IV фасцій шиї, які тупо розділяють ?

Як виконують комірцевий розріз Кохера?

-розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

+розріз здійснюють на 3 см вище від вирізки груднини в поперечному напрямку по нижній шкірній складці шиї між внутрішніми краями грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-починають від заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза на 2 см нижче від соскоподібного відростка, пересікають грудинно-ключично-соскоподібний м'яз і по його передньому краю доводять до яремної вирізки груднини

-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад, проводять уздовж ключиці до переднього краю трапецієподібного м'яза

-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза

?

Як виконують розріз Д'яконова?

-розріз здійснюють на 3 см вище від вирізки груднини в поперечному напрямку по нижній шкірній складці шиї між внутрішніми краями грудинно-ключично-соскоподібного м'яза

-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад, проводять уздовж ключиці до переднього краю трапецієподібного м'яза

+роблять розріз під краєм нижньої щелепи, після цього ведуть його вниз, уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза до яремної вирізки груднини, повертають назад, проводять уздовж ключиці до переднього краю трапецієподібного м'яза

-розріз починають від рівня верхнього краю щитоподібного хряща і ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза до яремної вирізки груднини

-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля груднини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза ?

Де розташовуються верхні паращитоподібні залози?

-на задній поверхні щитоподібної залози між капсулою і вісцеральним листком IV фасції шиї на рівні перешийки щитоподібної залози

-на передній поверхні щитоподібної залози між капсулою і вісцеральним листком IV фасції шиї на рівні перешийки щитоподібної залози

-на задній поверхні щитоподібної залози між капсулою і вісцеральним листком IV фасції шиї на рівні під'язикової кістки

-на задній поверхні щитоподібної залози між парієтальним і вісцеральним листками IV фасції шиї на середині відстані між верхнім полюсом і перешийком

+на задній поверхні щитоподібної залози між капсулою і вісцеральним листком IV фасції шиї на рівні персноподібного хряща, на середині відстані між верхнім полюсом і перешийком

?

Де розташовуються нижні паращитоподібні залози?

+у нижнього полюса залози у місці входження а.

thyreoidea

inferior

-на передній поверхні щитоподібної залози між капсулою

і вісцеральним листком IV фасції шиї на рівні перешийка щитоподібної залози

-на задній поверхні щитоподібної залози на рівні перешийка

-на рівні під'язикової кістки

-у нижнього полюса залози на рівні персноподібного хряща

?

Чим обмежений вхід у гортань позаду?

-надгортанником

+верхівками черпакуватоподібних хрящів

-plicae aryepiglotticae

-membrana thyreoidea

-персноподібним хрящем

?

Чим обмежений вхід у гортань збоку?

-надгортанником

-персноподібним хрящем

-membrana thyreoidea

+plicae aryepiglotticae

-верхівками черпакуватоподібних хрящів

?

У яких межах стосовно кістяка розташовується гортань у дорослих?

-від III - VI шийних хребців

-від II - IV шийних хребців

-від II - VI шийних хребців

-від IV - VII шийних хребців

+від IV - VI шийних хребців

?

Що розташовано попереду від гортані?

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. omohyoideus,

m. thyrohyoideus

+m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyrohyoideus,

пірамідальна частина щитоподібної залози

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,

m. sternocleidomastoideus

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m.

thyrohyoideus,

m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus

-a. catis communis, n. vagus, v. jugularis interna

?

Що розташовано позаду від гортані?

+глотка, стравохід

-частки щитоподібної залози

-a. catis communis, n. vagus, v. jugularis interna

-глотка, стравохід, a. thyroidea inferior

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m.

thyrohyoideus,

m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus

?

Що розташовано з боків від гортані?

-a. carotis communis, m. sternohyoideus,

m. sternothyroideus

+частки щитоподібної залози, a. carotis communis

-частки щитоподібної залози, m. sternohyoideus,

m. sternothyroideus

-a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis interna

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m.

thyrohyoideus,

m. omohyoideus, m. sternocleidomastoideus

?

Де починається шийний відділ трахеї?

-на рівні IV шийного хребця

-від III - IV шийних хребців

-на рівні III шийного хребця

+на рівні VI шийного хребця

-на рівні V шийного хребця

?

На якому рівні стосовно кістяка розташовується

біфуркація трахеї?

-на рівні IV грудного хребця

-на рівні VI грудного хребця

-на рівні VII грудного хребця

+на рівні V грудного хребця

-від VI шийних хребців

?

Що розташовано попереду від трахеї?

+m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, щитоподібна залоза

і її перешийок, передтрахея клітковина

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m. thyroideus, щитоподібна залоза її перешийок, передтрахея

клітковина

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus, m.

omohyoideus,

щитоподібна залоза і її перешийок

-m. sternohyoideus, m. sternothyroideus,

m. sternocleidomastoideus, щитоподібна залоза

і її перешийок

-глотка, стравохід, a. thyroidea inferior

?

Що розташовано в передтрахеї клітковині?

-a. thyroidea ima, plexus venosus thyroideus impar,

vv. thyroidea inferiores, v. jugularis interna,

v. brachiocephalica sinistra, truncus brachiocephalicus

+a. thyroidea ima, plexus venosus, thyroideus impar,

vv. thyroidea inferiores, thymus,

v. brachiocephalica sinistra, truncus brachiocephalicus

-a. thyroidea ima, vv. thyroideus inferiores, n. vagus,

v. brachiocephalica sinistra, truncus brachiocephalicus

-a. thyroidea ima, vv. thyroideus inferiores,

v. jugularis interna, n. vagus, n. laryngeus recurrens

-глотка, стравохід, a. thyroidea inferior

?

Які кільці трахеї розсікають при верхній трахеотомії?

+II - III

-I - II

-III - IV

-III - VI

-I - II - III

?

Як виконують верхню трахеотомію?

- розсікають II і III кільця трахеї, ріжучу поверхню направляють каудально
- розсікають I і II кільця трахеї, лезом скальпеля не більше 1 см ріжучу поверхню направляють паралельно
- +розсікають II і III кільця трахеї, трахею проколюють як списом лезом скальпеля не більше 1 см, ріжучу поверхню направляють краніально
- розсікають II і IV кільця трахеї лезом скальпеля не більше 1 см, ріжучу поверхню направляють краніально
- починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
- біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза

?

Назвіть клітковинні простори на шляху до трахеї при нижній трахеотомії:

- spatium interaponeuroticum suprasternale, spatium pretracheale, spatium retroviscerale
- saccus caecus retrosternocleidomastoideus, spatium pretracheale
- saccus caecus retrosternocleidomastoideus, spatium pretracheale, spatium prevertebrale
- spatium interaponeuroticum suprasternale, spatium pretracheale, spatium prevertebrale
- +spatium interaponeuroticum suprasternale, spatium pretracheale

?

Назвіть можливі ускладнення при виконанні трахеотомії:

- кровотеча, дисфагія, некроз хрящів, аспіраційна пневмонія,
- асфіксія, ушкодження стравоходу, torticollis
- +підшкірна емфізема, некроз хрящів, аспіраційна пневмонія,
- кровотеча, асфіксія, ушкодження стравоходу
- гемімімія, кровотеча, дисфагія, асфіксія, ушкодження стравоходу, некроз хрящів
- підшкірна емфізема, дисфагія, кровотеча, некроз хрящів, геміглоссоплегія, пневмонія
- некроз хрящів, аспіраційна пневмонія, асфіксія, ушкодження стравоходу, torticollis

?

Що розташовано попереду від шийного відділу стравоходу?

- +перснеподібний хрящ, трахея, лівий поворотний нерв
- частки щитоподібної залози, трахея, лівий поворотний нерв
- трахея, v. brachiocephalica sinistra, загальні сонні артерії
- трахея, правий поворотний нерв, частки щитоподібної залози
- глотка, a. thyreoidea inferior

?

Що розташовано збоку від шийного відділу стравоходу?

- глотка, a. thyreoidea inferior

-лівий поворотний нерв, бічні частки щитоподібної залози,

- a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus
- бічні частки щитоподібної залози, a. carotis communis, n. vagus, a. thyreoidea inferior, v. jugularis interna
- +правий поворотний нерв, бічні частки щитоподібної залози,

- a. thyreoidea inferior, a. carotis communis, ductus thoracicus

- бічні частки щитоподібної залози, a. carotis communis, трахея, медіастінальна плевра, правий поворотний нерв

?

На якому рівні стосовно кістяка розташовується шийний відділ стравоходу?

- +від VI шийного до II грудного
- від IV шийного до I грудного
- від V шийного до I грудного
- від VII шийного до III грудного
- від II шийного до III грудного

?

Що розташовано за шийним відділом стравоходу?

- хребетний стовп, m. longus capitis, spatium retroviscerale, fascia prevertebralis
- хребетний стовп, глотка, m. longus colli, fascia prevertebralis, spatium retroviscerale
- +хребетний стовп, m. longus colli, spatium retroviscerale, fascia prevertebralis
- хребетний стовп, m. longus colli, fascia prevertebrale, n. laryngeus recurrens
- глотка, a. thyreoidea inferior

?

Яким швом ушивають стінку стравоходу?

- однорядним вузловим
- дворядним поперечним
- +перший ряд вузлових швів накладають на всі шари стінки,
- другий ряд на адвентицію і м'язову оболонку
- перший ряд вузлових швів накладають на слизову, другий на адвентицію і м'язову оболонку
- П-подібним однорядним

?

Яким доступом оголюють шийний відділ стравоходу?

- роблять поперечний розріз над яремною вирізкою грудини між внутрішніми краями грудинно-ключично-соскоподібних м'язів
- розріз виконують на протязі 5 - 6 см у нижньому відділі бокової поверхні шиї
- розріз завдовжки 5 - 6 см роблять від вершини щитоподібного хряща вниз
- +розріз ведуть уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза зліва від яремної вирізки грудини до верхнього краю щитоподібного хряща
- починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж

заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до
заднього краю трапецієподібного м'яза
?
Яким доступом оголюють загальну сонну артерію?
-розріз проводять уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза від кута нижньої
щілини завдовжки 5 - 6 см
+розріз проводять уздовж переднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза від верхнього краю
щитоподібного хряща завдовжки 5 - 6 см
-розріз Петровського
-розріз Кюттнера
-починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до
заднього краю трапецієподібного м'яза
?
Які шари розсікають для оголення загальної сонної артерії?
-шкіру, підшкірну клітковину, I фасцію шиї, m. platysma, II фасцію шиї, III фасцію шиї, m. omohyoideus, парієтальну пластинку IV фасції шиї
+шкіру, підшкірну клітковину, I фасцію шиї, m. platysma, II фасцію шиї, парієтальну пластинку IV фасції шиї
-шкіру, підшкірну клітковину, I фасцію шиї, m. platysma, II фасцію шиї, m. sternocleidomastoideus, III фасцію шиї, m. omohyoideus, парієтальну пластинку IV фасції шиї
-шкіру, підшкірну клітковину, I фасцію шиї, m. platysma, II фасцію шиї, m. sternocleidomastoideus, III фасцію шиї, m. omohyoideus, парієтальну і вісцеральну пластинки IV фасції шиї
-шкіру розсікають починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза,
біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до
заднього краю трапецієподібного м'яза
?
Про які анатомічні утворення необхідно пам'ятати при оголенні стравоходу?
-a. carotis communis, v. jugularis interna, n. vagus
-a. carotis externa, v. jugularis interna, n. laryngeus reccurens
+a. thyreoidea inferior sinistra, n. laryngeus reccurens
-a. thoracica interna, n. laryngeus reccurens
-a. cerebri anterior, a. communicans anterior, a. cerebri posterior, a. communicans posterior
?
Які артерії на основі мозку мають важливе значення в окольному кровообігу при перев'язці загальної сонної артерії?
-a. cerebri anterior, a. communicans anterior,

a. cerebri posterior, a. communicans posterior
-a. cerebri media, a. communicans anterior, a. cerebri posterior, a. communicans posterior
+a. communicans anterior, a. communicans posterior
-a. cerebri anterior, a. cerebri media, a. cerebri posterior
-a. carotis externa, v. jugularis interna, n. laryngeus reccurens
?
Які анастомози позачерепних артерій з внутрічерепними мають важливе значення в окольному кровообігу при перев'язці загальної сонної артерії?
-a. dorsalis nasi з a. supraorbitalis, a. supraorbitalis з a. temporalis superficialis, a. vertebralis з a. occipitalis
+a. dorsalis nasi з a. angularis, a. supraorbitalis з a. temporalis superficialis, a. vertebralis з a. cervicalis profunda, a. vertebralis з a. occipitalis
-a. supraorbitalis з a. supratrochlearis, a. temporalis superficialis з a. occipitalis, a. dorsalis nasi з a. angularis
-a. vertebralis з a. temporalis superficialis, a. dorsalis nasi з a. angularis, a. supraorbitalis з a. supratrochlearis
-a. carotis externa, v. jugularis interna, n. laryngeus reccurens
?
!2 Які анастомози позачерепних артерій мають важливе значення в окольному кровообігу при перев'язці загальної сонної артерії:
-a. thyreoidea superior з a. cervicalis profunda, a. facialis з a. temporalis superficialis, a. occipitalis з a. temporalis superficialis
-a. thyreoidea superior з a. thyreoidea inferior, a. facialis з a. temporalis superficialis, a. occipitalis з a. cervicalis profunda
+a. thyreoidea superior з однойменною артерією протилежної сторони, a. thyreoidea superior з a. thyreoidea inferior, a. occipitalis з a. cervicalis profunda
-a. temporalis superficialis з однойменною артерією протилежної сторони, a. thyreoidea superior з a. thyreoidea inferior, a. facialis з a. occipitalis
-a. carotis externa, v. jugularis interna, n. laryngeus reccurens
?
Назвіть скелетотопію глотки:
+від основи черепа до VI шийного хребця
-від pars nasalis до pars laryngea
-від IV шийного до VII шийного хребця
-від твердого піднебіння до входу у гортань
-від VI шийного до I грудного хребця
?
Що розташовано попереду від глотки?
-стравохід, щитоподібна залоза
-щитоподібна залоза, m. longus capitis
-гортань, щитоподібна залоза
-гортань, щитоподібна залоза, m. longus capitis
+порожнина носа, порожнина рота, гортань

?

Що розташовано позаду від глотки?

- тіла шийних хребців, гортань, стравохід, m. longus colli, заглотковий простір
- щитоподібна залоза, m. longus capitis
- +тіла шийних хребців, m. longus colli, fascia prevertebralis, заглотковий простір
- тіла шийних хребців, m. longus colli, ductus thoracicus, fascia prevertebralis
- тіла шийних хребців, m. longus colli, fascia prevertebralis, стравохід

?

Що розташовано збоку від глотки?

- a. carotis interna, v. jugularis interna, IX - XII пари черепно-мозкових нервів
- a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis interna, частки щитоподібної залози
- +загальні сонні артерії, частки щитоподібної залози, a. pharyngea ascendens, v. jugularis interna, a. carotis interna, IX - XII пари черепно-мозкових нервів, truncus sympathicus
- тіла шийних хребців, m. longus colli, ductus thoracicus, fascia prevertebralis
- a. carotis communis, n. vagus, v. jugularis interna, частки щитоподібної залози, n. laryngeus recurrens, a. pharyngea ascendens

?

Укажіть хід нижньої щитоподібної артерії:

- +проходить за a. carotis communis попереду від a. vertebralis
- проходить вгору по m. scalenus anterior
- проходить уздовж ключиці до incisura scapulae
- проходить у поперечному напрямку до драбинчастих м'язів
- проходить у поперечному напрямку до надпід'язикових м'язів

?

Укажіть топографію верхнього гортанного нерва:

- проходить попереду від a. carotis interna
- +іде з медіальної сторони a. carotis interna
- проходить між трахеєю і стравоходом
- проходить по передній поверхні трахеї
- проходить від pars nasalis до pars laryngea

?

Укажіть хід і ділянку іннервації r. internus n. laryngeus superior:

- проходить медіально від a. carotis interna, іннервує глотку
- проходить між трахеєю і стравоходом, іннервує гортань вище голосових зв'язок
- проходить від pars nasalis до pars laryngea та іннервують порожнину носа
- +разом з a. laryngea superior пронизує membrana thyrohyoidea, іннервує слизову гортані вище голосових зв'язок, корінь язика і надгортанник
- разом з a. laryngea superior пронизує membrana thyrohyoidea, іннервує слизову гортані нижче голосової щілини

?

Яким розрізом оголюють щитоподібну залозу при струмектомії?

- Де Кервена
- Петровського
- Д'яконова
- Люєра
- +Кохера

?

Як розсікають другу і третю фасції шиї при струмектомії:

- поперечним розрізом над яремною вирізкою груднини
- по передньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
- розрізом Петровського
- Люєра
- +по серединній лінії шиї

?

Назвіть автора субтотальної субфасціальної резекції щитоподібної залози:

- +Ніколаєв
- Кохер
- Люєра
- Мартінов
- Русанов

?

Назвіть оперативне втручання при вузловому зобі:

- субтотальна субфасціальна резекція залози
- енуклеація вузла
- Люєра

+резекція частки щитоподібної залози

-тотальна екстирпація щитоподібної залози

?

Які симптоми виникають після видалення парашитоподібних залоз?

- М'юбіуса
- +Хвостека, Труссо
- Штельвага
- Люєра
- Горнера

?

Що необхідно зробити в екстренній ситуації при глибокій асфіксії?

- коникотомію
- верхню трахеотомію
- +коникоцентез
- операцію Осава-Гарлока
- трахеотомію за Б'йорком

?

Який розріз роблять при коникотомії?

- продольний по серединній лінії
- Кохера
- розріз Волковича
- поперечний над яремною вирізкою груднини
- +поперечний у проміжку між перснеподібним і щитоподібним хрящами

?

Назвіть спеціальний інструментарій, який

використовують при трахеотомії:

- +канюля Люєра, однозубі гострі гачки Кохера, розширювач Труссо

-канюля Люєра, распатор, пластинчасті гачки Лангенбека
 -канюля Люєра, пластинчасті гачки Фарабера, розширювач Труссо
 -канюля Люєра, кровоспинні затискачі, однозубі гострі гачки, розширювач Труссо
 -канюля Люєра, пластинчасті гачки Лангенбека, розширювач Труссо
 ?
 Як виконують трахеотомію за методом Б'йорка?
 -розріз проводять по середній лінії від перснеподібного хряща до вирізки грудини, розсікають II і III кільця трахеї які фіксують до шкіри
 +на передній стінці трахеї викроюють язикоподібний лоскут
 верхівкою звернутий нагору, кінці лоскута фіксують до шкіри
 -поперечним розрізом між перснеподібним і щитоподібним хрящами розсікають трахею, краї рани трахеї фіксують до шкіри
 -трахею розсікають між II і III кільцями, краї рани фіксують до шкіри
 -шкіру розсікають починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза
 ?
 Що розташовано ззовні від fascia pharyngobasilaris?
 -слизова
 -парафарінгеальна клітковина
 +м'язова оболонка
 -адвентиція
 -заглотковий простір
 ?
 Що розташовано ззовні від м'язової оболонки глотки?
 -fascia pharyngobasilaris
 -слизова оболонка
 -парафарінгеальна клітковина
 +fascia buccopharyngea
 -адвентиція
 ?
 Що розташовано зовні від fascia buccopharyngea?
 +парафарінгеальна клітковина
 -м'язова оболонка
 -слизова оболонка
 -fascia pharyngobasilaris
 -адвентиція
 ?
 Кровопостачання глотки здійснюють:
 -a. pharyngea ascendens, a. palatina ascendens, a. palatina descendens, a. thyreoidea superior et inferior, a. cervicalis ascendens
 -a. pharyngea ascendens, a. palatina descendens, a. thyreoidea superior et inferior, a. cervicalis profunda
 +a. pharyngea ascendens, a. palatina ascendens,

a. palatina descendens, a. canalis pterygoideus, a. thyreoidea superior, a. thyreoidea inferior
 -a. pharyngea ascendens, a. palatina ascendens, a. palatina descendens, a. thyreoidea superior et inferior
 -a. palatina descendens, a. palatina ascendens, a. thyreoidea superior et inferior
 ?
 Чим іннервується глотка?
 -n. glossopharyngeus, n. vagus, n. hypoglossus, truncus sympaticus
 -n. glossopharyngeus, n. accessorius, n. vagus, truncus sympaticus
 -n. glossopharyngeus, n. vagus, n. phrenicus, truncus sympaticus
 -n. accessorius, n. vagus, truncus sympaticus
 +n. glossopharyngeus, n. vagus, truncus sympaticus
 ?
 Яким розрізом розкривають абсцес заглоткового простору?
 +через порожнину рота поздовжнім розрізом задньої стінки глотки на глибину 1 см, довжиною 2 см
 -дугоподібним розрізом в ділянці кута нижньої щелепи
 -розріз проводять по передньому краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза
 -розрізом Кохера
 -шкіру розсікають починають на рівні під'язикової кістки, ведуть уздовж заднього краю грудинно-ключично-соскоподібного м'яза, біля грудини повертають назад, проводять уздовж ключиці до заднього краю трапецієподібного м'яза
 ?
 Кровопостачання шийного відділу стравоходу здійснюється:
 -a. thyreoidea superior
 +a. thyreoidea inferior
 -a. pharyngea ascendens
 -a. cervicalis profunda
 -a. palatina descendens
 ?
 Що необхідно зробити перед завершенням шва артеріотонічного отвору при каротидній тромбendarтеректомії?
 -видалити бляшку з просвіту артерії
 -відшарувати і видалити бляшку з просвіту артерії
 +вимити тромби, видалити повітря
 -балонну ангіопластику
 -встановити стент
 ?
 Назвіть перший етап операції тромбendarтеректомії:
 -вимити тромби
 -видалити повітря
 -встановлення стента
 +відшарування бляшки з артерій
 -відшарувати бляшки і видалити тромби

?

Як видаляють тромби при тромбендартеректомії?

- вводять гепарин
- вводячи фраксипарин
- шляхом балонної ангіопластики
- проводять плексектомію
- +шляхом поетапного пуску кровотока

?

У якій послідовності здійснюють поетапний пуск кровотока

при видаленні тромбів?

- +шляхом ретроградного кровотока із внутрішньої, зовнішньої і антеградного кровотока із загальної сонних артерій
- шляхом ретроградного кровотока із зовнішньої, внутрішньої і антеградного кровотока із загальної сонних артерій
- шляхом антеградного кровотока із зовнішньої, внутрішньої і антеградного кровотока із загальної сонних артерій
- шляхом антеградного кровотока із внутрішньої, зовнішньої і ретроградного кровотока із загальної сонних артерій
- шляхом ретроградного кровотока із загальної сонної артерії і антеградного кровотока із внутрішньої і зовнішньої сонних артерій
- кукси 12-палої кишки і шлунка зближують і формують шлунково-кишковий анастомоз
- після оброблення кукси 12-палої кишки та резекції шлунка формують шлунково-кишковий анастомоз та довгий петлі на весь просвіт кукси шлунка
- накладають міжкишковий анастомоз Брауна
- мобілізують велику кривину шлунка і перев'язують ліву і праву шлункові артерії